

**ET TOI ? Tu te
PROTÈGES DE
L'HERPÈS ?**

**À fond la
caisse !**



ÇA SE VOIT ?

Des symptômes peuvent apparaître entre 2 à 20 jours après la contamination :


- Vésicules (cloches) remplies de liquide puis boutons, sur les organes génitaux ou l'anus. Douleurs souvent importantes.
- Douleurs quand on urine.

➔ Les symptômes peuvent apparaître plusieurs années après que tu aies été infecté(e). Il faut donc se protéger et protéger ton/ta/tes partenaire(s) après une prise de risque.

COMMENT TE DÉPISTER ?

Examen médical, frottis¹ ou prise de sang (s'il n'y a pas de symptômes).

1 Frottis : prélèvement médical sans douleur d'un liquide ou de cellules de l'organisme en vue d'un examen microscopique.



ÇA SE SOIGNE ?

Crèmes ou traitements antiviraux appropriés qui permettent de soulager et de freiner les récives, mais pas de guérir. On reste porteur à vie. La maladie évolue souvent par poussées (provoquées par la fatigue, le stress, l'exposition au soleil, l'immuno-dépression,...)

COMMENT ÇA SE TRANSMET ?

- Rapport sexuel : par contact direct avec les vésicules présentes au niveau de la vulve², du pénis ou de l'anus ou par les sécrétions provenant du col utérin, du vagin, de l'urètre, de l'anus.
- Si herpès buccal (bouton de fièvre) : transmission possible mais peu fréquente de la bouche à la vulve, au pénis ou à l'anus.
- Par transmission de la mère à l'enfant.

COMMENT TE PROTÉGER ?

- Préservatif (protection réelle mais pas totale).

2 Vulve : l'ensemble des organes génitaux externes de la femme.



PARLEZ-EN



PROTÉGEZ-VOUS



DÉPISTEZ-VOUS ET
SOIGNEZ-VOUS

Tu peux évaluer le risque d'avoir été infecté(e) par une IST et trouver un lieu de dépistage proche de chez toi en surfant sur

WWW.PREVENTIONIST.ORG



Ed resp. Thierry Martin, Plate-Forme Prévention Sida,
151 rue Jourdan, 1060 Bruxelles.