

MÈTODES ANTICONCEPTIUS

GAUDEIX DE LA SEXUALITAT
AMB TRANQUIL·LITAT



Govern
de les Illes Balears
Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública
i Participació



MÈTODES DE BARRERA QUÍMICS (Espermicides i òvuls vaginals)

Alteren la mobilitat dels espermatozoides o els maten. S'han d'utilitzar combinats amb el preservatiu o amb el diafragma.
TOTS SÓLS NO OFEREIXEN UNA PROTECCIÓ SUFICIENT.

MÈTODES DE BARRERA

Impedeixen que els espermatozoides passin a la cavitat uterina.

EFICÀCIA ALTA.

MÈTODES ANTICONCEPTIUS HORMONALS

Impedeixen l'ovulació mitjançant l'administració d'una hormona (progesterona) o de diverses (progesterona i estrogen).

EFICÀCIA MOLT ALTA.

PRESERVATIU MASCULÍ

Funda impermeable de làtex, poliuretà o poliestirè, que es col·loca en el penis quan està en erecció.

PRESERVATIU FEMENÍ

Bossa petita de poliuretà, lubricada i tancada per un costat, amb una anella flexible i adaptable a cada extrem.

DIAFRAGMA

Caputxa de làtex o silicona que s'encaixa dins el coll de l'úter.

MÈTODES DE BARRERA QUÍMICS

(Espermicides i òvuls vaginals)

MÈTODES ANTICONCEPTIUS HORMONALS

Impedeixen l'ovulació mitjançant l'administració d'una hormona (progesterona) o de diverses (progesterona i estrogen).

EFICÀCIA MOLT ALTA.

PASTILLA

INJECTABLES

Comprimit que conté una hormona (minipastilla) o dues hormones (pastilla combinada).

Suspensions

(líquids) que contenen una o dues hormones.

ANELL VAGINAL

ESTERILITZACIÓ TUBÀRICA

Anell de plàstic flexible que s'introdueix dins la vagina i allibera hormones.

Objecte flexible que du enrotllat un filament de coure o de poliuretà. Pot incorporar un reservori hormonal que allibera progesterona per inhibir l'ovulació.

IMPLANT SUBCUTANI

LLIGADURA DE TROMPES

Petita vareta de plàstic que es col·loca davall la pell i allibera una hormona.

OGINO-KNAUS (mètode del calendari)

Càlcul del dia probable d'ovulació segons les etapes del cicle menstrual.

PEGAT ANTICONCEPTIU

BILLINGS (mètode del moc cervical)

S'observa diàriament el moc vaginal (és més fluid durant l'ovulació).

VASECTOMIA

Bloqueig dels conductes deferents mitjançant una intervenció quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

TEMPERATURA BASAL

Es pren diàriament la temperatura i s'observa quan puja (la temperatura augmenta lleugerament després d'ovular: entre 0,2 i 0,4 graus).

TOTS SÓLS NO OFEREIXEN UNA PROTECCIÓ SUFICIENT.

MÈTODES PERMANENTS

DISPOSITIUS INTRAUTERINS

Impedeixen que l'òul passi a l'úter (esterilització tubàrica i lligadura de trompes) o que els espermatozoides surtin a l'exterior (vasectomia). **EFICÀCIA MOLT ALTA.**

EFICÀCIA MOLT ALTA.

COIT INTERROPUT "MARXA ENRERE"

LACTÀNCIA

COIT DURANT LA MENSTRUACIÓ

DUTXA VAGINAL

NO SÓN MÈTODES ANTICONCEPTIUS

Dificulen l'ascens dels espermatozoides i impedeixen la nidació de l'òul provocant una inflamació dins l'úter.

EFICÀCIA MOLT ALTA.

DIU I DIU HORMONAL

Dispositiu flexible que du enrotllat un filament de coure o de poliuretà. Pot incorporar un reservori hormonal que allibera progesterona per inhibir l'ovulació.

ANTICONCEPCIÓ D'URGÈNCIA

PASTILLA POSTCOITAL O DE L'ENDEMÀ

Tractament hormonal que bloqueja o retarda l'ovulació.

S'HA D'UTILITZAR NOMÉS DE MANERA excepcional.

BILLINGS (mètode del moc cervical)

S'ha de prendre, com més aviat millor, després de la relació sexual (coit sense protecció o si ha fallat el mètode anticonceptiu).

EVITAR UN EMBARÀS ÉS QÜESTIÓ DE DOS, ÉS UNA RESPONSABILITAT QUE S'HA DE COMPARТИR

TEMPERATURA BASAL

Es pren diàriament la temperatura i s'observa quan puja (la temperatura augmenta lleugerament després d'ovular: entre 0,2 i 0,4 graus).

DISPOSITIUS INTRAUTERINS

Impedeixen que l'òul passi a l'úter (esterilització tubàrica i lligadura de trompes) o que els espermatozoides surtin a l'exterior (vasectomia). **EFICÀCIA MOLT ALTA.**

EFICÀCIA MOLT ALTA.

COIT INTERROPUT "MARXA ENRERE"

LACTÀNCIA

COIT DURANT LA MENSTRUACIÓ

DUTXA VAGINAL

ANTICONCEPCIÓ D'URGÈNCIA

Consisteixen a evitar el coit vaginal durant els dies en què és més probable l'ovulació. **L'EFICÀCIA ÉS MOLT BAIXA** atès que en qualsevol moment es pot produir una ovulació i és possible l'embaràs.

L'EFICÀCIA ÉS MOLT BAIXA

ABANS D'UTILITZAR UN MÈTODE ANTICONCEPTIU

Informa't
Acudeix al teu centre de salut

Assegura't que en coneixes:

- l'eficàcia
- les contraindicacions i els efectes adversos
- com utilitzar-lo correctament
- la forma de conservació i la data de caducitat

Pensa en la doble protecció
(preservatiu i un altre mètode anticonceptiu).

Només el preservatiu protegeix davant les infeccions de transmissió sexual.

Evitar un embaràs
és qüestió de dos, és
una responsabilitat
que s'ha de compartir



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

DISFRUTA DE LA SEXUALIDAD CON TRANQUILIDAD



Govern
de les Illes Balears

Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública
i Participació



MÉTODOS BARRERA QUÍMICOS (Espermicidas y óvulos vaginales)

Alteran la movilidad de los espermatozoides o los matan. Tienen que utilizarse combinados con el preservativo o con el diafragma.
SOLOS NO OFRECEN UNA SUFICIENTE PROTECCIÓN.

MÉTODOS BARRERA

Impiden que los espermatozoides pasen a la cavidad uterina.

EFICACIA ALTA.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Impiden la ovulación mediante la administración de una hormona (progestágeno) o diversas hormonas (progestágeno y estrógeno).
EFICACIA MUY ALTA.

PASTILLA

Comprimido que contiene una hormona (minipastilla) o dos hormonas (pastilla combinada).



INJECTABLES

Suspensiones (líquidos) que contienen una o dos hormonas.

ANILLO VAGINAL

Anillo de plástico flexible que se introduce dentro de la vagina y libera hormonas.




IMPLANTE SUBCUTÁNEO

Pequeña varilla de plástico que se coloca debajo de la piel y libera una hormona.



PARCHE ANTICONCEPTIVO

Tira adhesiva que se pega a la piel y libera lentamente dos hormonas.



MÉTODOS PERMANENTES

Impiden que el óvulo pase al útero (esterilización tubárica y ligadura de trompas) o que los espermatozoides salgan al exterior (vasectomía). **EFICACIA MUY ALTA.**




ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA

Dispositivo flexible que se introduce en las trompas de Falopio por vía vaginal, para obstruirlas.



DIU I DIU HORMONAL

Objeto flexible que lleva enrollado un filamento de cobre o poliuretano. Puede incorporar un reservorio hormonal que libera progestágeno para inhibir la ovulación.



MÉTODOS NATURALES


Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquee o retrasa la ovulación.

LIGADURA DE TROMPAS

Bloqueo de las trompas de Falopio mediante intervención quirúrgica.



OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

BILLINGS (método del moco cervical)

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

NO SON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

COITO INTERRUMPIDO "MARCHA ATRÁS"

COITO DURANTE LA MENSTRUACIÓN

DUCHA VAGINAL



ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquee o retrasa la ovulación.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.



BILLINGS (método del moco cervical)

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

ANTES DE UTILIZAR UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO

Infórmate Acude a tu centro de salud

Asegúrate de que conoces:

- su eficacia
- sus contraindicaciones y efectos adversos
- cómo utilizarlo correctamente
- su forma de conservación y fecha de caducidad

Piensa en la doble protección (preservativo i otro método anticonceptivo).

Sólo el preservativo protege frente a las infecciones de transmisión sexual.



Evitar un embarazo es cuestión de dos, es una responsabilidad que hay que compartir