

# ABORTO INDUCIDO EN HOSPITALES DE REFERENCIA DE LA REGIÓN PUNO Y SU IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL 2010

## INDUCED ABORTION IN REFERENCE HOSPITAL PUNO REGION AND ITS IMPACT ON PUBLIC HEALTH IN 2010

*Elizabeth Vargas Onofre*

### RESUMEN

**O** **bjetivo:** Analizar el aborto inducido en Hospitales de Referencia de la Región Puno y su impacto en la Salud Pública en el 2010. **Metodología:** Investigación básica y descriptiva de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, retrospectivo y explicativo. El diseño es Ex Post Facto, se realizó de enero a diciembre del 2010 y transversal para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el análisis documental cuyos instrumentos fueron el cuestionario, La población objetivo totalizó a 301 informantes pacientes que acudieron a la atención de aborto y consulta por infertilidad en los Hospitales “Manuel Núñez Butrón” de Puno y “Carlos Monge Medrano” de Juliaca y los **resultados** de la investigación fueron: En la Región Puno los factores que más contribuyen al aborto inducido en mujeres atendidas en Hospitales de Referencia de la Región Puno en el 2010 son las condiciones desfavorables el cual produce un alto impacto en la Salud Pública ocasionando infertilidad y muerte en las mujeres que se practican el aborto provocado. Los factores personales que más involucran la decisión de interrumpir el embarazo son la edad 19 a 30 años en 48.5 % en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y 57.2% el Hospital Carlos Monge Medrano, el estado civil en ambos hospitales es conviviente, la ocupación su casa 40,5 % en el hospital de Puno y 60.9 % en el Hospital de Juliaca. Los factores desfavorables que inducen al aborto en mujeres de la Región Puno son económicas y deseos de estudiar, el lugar donde se realiza el aborto son clínicas privadas y casas particulares, las personas que lo realiza son los Médicos y obstetras quienes utilizan el misoprostol por vía oral y vaginal, así mismo se realiza por medio de la aspiración manual con complicaciones como la hemorragia, el costo referido en ambos hospitales es regular, en la opinión sobre la práctica del aborto se debe realizar en algunos casos como la violación. En **Conclusión**, el impacto del aborto en la salud pública se manifiesta en las muertes maternas por aborto que, según nuestra investigación, resulta ser en un mayor porcentaje que las cifras oficiales, el número de muertes maternas ocurridas en la Región en el 2010 fueron 27 de los cuales por causa del aborto inducido fueron 04, dos en el Hospital Manuel Núñez Butrón y dos en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Las mujeres atendidas por consulta de infertilidad en Hospitales de Referencia de la Región Puno en el 2010, tienen el antecedente de uno o más abortos provocados y consideran que es por factor tubario; la mayoría atribuyen al aborto la causa de infertilidad y muestran arrepentimiento y sentimientos de culpa.

**PALABRAS CLAVE:** Aborto inducido, mortalidad materna e infertilidad.

### ABSTRACT

**Objective:** To analyze the induced abortion in referral hospitals in the Puno region and its impact on public health in 2010. **Methodology:** basic research and descriptive approach of quantitative, non-experimental, cross-sectional, retrospective and explanatory. The design is Ex Post Facto, was conducted from January to December 2010 and transverse to the data collection technique of the survey and the documentary analysis whose instruments were the questionnaire, the target population totaled

301 informants to patients who came to the attention of abortion and consultation for infertility in hospitals "Manuel Nunez Butron" of Puno and "Carlos Monge Medrano" from Juliaca and the **results** of the investigation were: In the Puno region the factors that contribute to abortion among women attending referral hospitals in the Puno region in 2010 are unfavorable conditions which produce a high impact on public health, causing infertility and death in women who practiced induced abortion. The more personal factors that involve the decision to terminate pregnancy are age 19 to 30 years to 48.5% in the Hospital Manuel Nunez Butron of Puno and 57.2% in Hospital Carlos Monge Medrano, marital status at both hospitals is married, the occupation home in the hospital 40.5% and 60.9% of Puno's Hospital in Juliaca. The unfavorable factors that induce abortion in women in the Puno region are cheap and want to study, where abortion is performed are private clinics and private homes, people performing it are the doctors and obstetricians who use misoprostol oral and vaginal, and it is done by manual aspiration with complications such as bleeding, the cost referred to in both hospitals is regular, in the opinion on the practice of abortion should be performed in some cases such as rape. In **conclusion**, the impact of abortion in public health is reflected in maternal deaths from abortion, according to our research, turns out to be at a greater rate than the official figures, the number of maternal deaths in the region in 2010 were 27 of them because of induced abortion was 04, two at the Hospital Manuel Nunez Butron and two in the hospital Carlos Monge Medrano in Juliaca. Women treated for infertility consultation Referral Hospital Puno region in 2010, have a history of one or more induced abortions and consider it to tubal factor, most attributed to the cause of infertility, abortion and show repentance and feelings of guilt.

**Keywords:** Induced Abortion, maternal mortality and infertility.

## INTRODUCCIÓN

A pesar de que en la actualidad existe una gran variedad de métodos anticonceptivos, el aborto y el embarazo no deseado son problemas a los que cotidianamente se enfrenta una gran cantidad de mujeres de todas las edades y de todos los sectores sociales. El tema del aborto genera importantes controversias debido a que involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres; con las leyes y la política; con los valores éticos, morales y religiosos; con las condiciones socioeconómicas de las mujeres; y con las ideas que predominan en nuestro contexto cultural respecto a la feminidad y la maternidad.

El aborto practicado en condiciones inseguras es un problema social y de salud pública de gran importancia en el Perú. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como un procedimiento para interrumpir un embarazo no deseado, practicado por personas sin capacitación o experiencia, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos.

En el Perú se produce aproximadamente un millón de embarazos al año, de los cuales un tercio termina en aborto clandestino SPOG (1998); De los 630 mil nacimientos que ocurren, se considera que la mitad es resultado de un embarazo no deseado. Esta condición obliga a estas mujeres a llevar la gestación con desdén, sin enfatizar en los cuidados que su estado amerita, contribuyendo de esta manera a una mayor morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el Ministerio de Salud; sin embargo, algunos

estudios sostienen que dentro de las muertes por hemorragias e infecciones se encuentran sub registradas muchas muertes por aborto. En consecuencia, si existiera un buen registro de las muertes maternas, el aborto ocuparía posiblemente el segundo o tercer lugar.

Para muchas de las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado, la maternidad representa una experiencia impuesta por los patrones culturales que prevalecen en nuestra sociedad. Estudios realizados en otros contextos indican que la maternidad no deseada tiene importantes costos sociales y psicológicos para las mujeres y para los hijos que nacen en estas condiciones. Como señalan algunos de los autores que se han ocupado de estudiar esta problemática.

**Nuestro objetivo fue Analizar los factores que contribuyen al aborto inducido en mujeres atendidas en Hospitales de Referencia de la Región Puno en el 2010 y determinar su impacto en la Salud Pública. Para tal fin, se tomaron las variables factores del aborto inducido e impacto en la Salud Pública.**

### MÉTODOLÓGÍA

Se ejecutó un estudio que corresponde al tipo básico y descriptivo de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, retrospectivo y explicativo. El diseño es Ex Post Facto, se realizó de enero a diciembre del 2010, en los Hospitales “Carlos Monge Medrano” y “Manuel Núñez Butrón” de Puno y Juliaca.

Los datos se obtuvieron por procedimientos de captación directa mediante la ficha de investigación y de las historias clínicas respectivas de las pacientes. Estos datos se registraron en unas fichas de recolección de

datos elaboradas especialmente para éste fin. Para el procesamiento de datos se utilizó el cálculo porcentual y el análisis a través del chi cuadrado. Se realizó una encuesta a 301 pacientes que fueron hospitalizadas por aborto incompleto, en los Hospitales de Puno y Juliaca, en el año 2010. Para precisar el número de muertes maternas ocurridas en la Región por causa del aborto en los últimos años se recurrió a los archivos de la Oficina General de Epidemiología del MINSA donde se revisó la documentación pertinente para establecer con exactitud la causa del deceso. Para establecer en qué medida la infertilidad es una consecuencia del aborto inducido se acudió a los Hospitales donde se entrevistó a 81 pacientes que acudieron por infertilidad. El objetivo es determinar si hay antecedentes de aborto provocado y en qué medida estos episodios tienen gravitación clínica y psicológica importante. Se aplicó una encuesta de 11 ítems.

## RESULTADOS

**CUADRO 1**  
**Lugar donde se realizó el aborto y hospital de estudio**

Edades	Hospital Puno		Hospital Juliaca	
	n <sub>i</sub>	%	n <sub>i</sub>	%
Clínica privada	93	57,0	24	17,4
Centro de salud	2	1,2	14	10,1
Consultorio particular	26	15,9	5	3,6
Casa particular	24	14,7	91	65,9
En su domicilio	18	11,0	4	2,9
Total	163	100,0	138	100,0

Fuente: Cuestionario anexo N° 1.

**CUADRO 2** Persona que realizó el aborto y hospital de estudio

Persona	Hospital Puno		Hospital Juliaca	
	n <sub>i</sub>	%	n <sub>i</sub>	%
Médico	45	27,6	67	48,6
Obstetra	65	39,9	52	37,7
Enfermero	8	4,9	11	8,0
Técnico	43	26,4	1	0,7
Curandero	2	1,2	7	5,0
Total	103	50,0	103	50,0

CUADRO 3

Complicaciones después del aborto y hospital de estudio

Complicación	Hospital Puno		Hospital Juliaca	
	n <sub>i</sub>	%	n <sub>i</sub>	%
Hemorragia	93	57,1	22	15,9
Infección	7	4,3	23	16,7
Dolor	48	29,4	41	29,7
Fiebre	2	1,2	8	5,8
Otro	13	7,9	44	31,9
Total	103	50,0	103	50,0

CUADRO 4

Causa de muerte y hospital de estudio año 2010

Causa	Hospital Puno		Hospital Juliaca	
	n <sub>i</sub>	%	n <sub>i</sub>	%
Hemorragia embarazo	02	12,5	00	00
Hemorragia post parto	08	50,0	05	45,5
Pre eclampsia	03	18,7	03	27,3
Aborto	02	12,5	02	18,2
Infección	00	00	01	9,0
Otro	01	6,3	00	00
Total	16	50,0	103	50,0

Fuente: Archivo Región de Salud Puno anexo N° 3 y 4.

CUADRO 5

Número de abortos provocados en mujeres que consulta por infertilidad y hospital de estudio

Abortos provocados	Hospital Puno		Hospital Juliaca	
	n <sub>i</sub>	%	n <sub>i</sub>	%
Ninguno	00	00	01	2,6
Uno	28	65,1	21	55,3
Dos	12	27,9	12	31,6
Más de dos	03	8,0	04	10,5
Total	43	100,0	38	100,0

Fuente: Cuestionario anexo N° 2.

## DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

### Discusión

Del Cuadro 1 el lugar donde se realizó el aborto del 100% de mujeres del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno lo hicieron en Clínicas privadas el 57,0%, Consultorio particular 16,0 %, Casa particular 15,0 y el 11,0% en su domicilio y Centro de salud 1,0% y del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca casa particular 66,0% Clínica privada el 17,0%, Centro de salud 10,0%, Consultorio particular 4,0 %, y el 3,0% en su domicilio. Se concluye que el lugar donde se realizó el aborto provocado es la Clínica privada y casa particular donde deciden terminar con el embarazo, últimamente se han aperturado

muchas clínicas en las ciudades de Puno y Juliaca donde se realizan los abortos con otros diagnósticos para encubrir sus actividades ilícitas y como se están realizando batidas a los consultorios particulares y clínicas privadas entonces lo hacen en casas particulares.

En el Cuadro 2 se observa la persona que realizó el aborto en mujeres del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno lo hacen Obstetras 40,0%, Médicos el 28,0%, Técnico 26,0, Enfermero 5,0 %, y 11,0% el curandero y del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca Médicos el 49,0%, Obstetra 38,0%, Enfermero 8,0 %, el curandero 5,0% y Técnico 1,0 %. Se concluye que quién realizó el aborto fue el profesional Médico y Obstetra esto explica que en las últimas décadas el mercado laboral profesional está muy saturado por lo que profesionales que no encuentran donde laborar abren consultorios privados para atención a pacientes sin embargo realizan actividades reñidas por la Ley y lejos de cumplir con su juramento hipocrático no velan por la salud de la comunidad.

En relación al Cuadro 3 las complicaciones del aborto en mujeres del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno fue hemorragia el 57,1%, otro el 7,9%, infección el 4,3% y fiebre 1,2% y del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca dolor el 29,7%, infección el 16,7%, hemorragia el 15,9%, fiebre el 5,8% y otro 31,9%. Se concluye que las complicaciones que tuvo después del aborto fueron hemorragia en el caso del hospital Manuel Núñez Butrón y dolor en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. En el hospital "Sergio E Bernales" el número de abortos incompletos se ha incrementado pero han

disminuido los abortos infectados en los últimos 14 años. Actualmente los abortos provocados son el 34% del total de incompletos, el número excesivo de hijos es el principal motivo. Uno de cada 2 ha sido provocado con misoprostol, principalmente facilitado por el vendedor de farmacia.

**En base al Cuadro 4 la causa de muerte de mujeres del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno fue hemorragia post parto el 50%, pre eclampsia el 18,7% aborto y hemorragia en el embarazo a 12.5% respectivamente y otra causa 6,3% y del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca fue hemorragia post parto el 45.5%, pre eclampsia el 27,3% aborto el 18,2 % e infección 9,0%. Se concluye que las causas de muerte fueron hemorragia postparto, pre eclampsia y aborto los dos nosocomios.** En el Perú se produce aproximadamente un millón de embarazos al año, de los cuales un tercio termina en aborto clandestino; de los 630 mil nacimientos que ocurren, se considera que la mitad es resultado de un embarazo no deseado. Esta condición obliga a estas mujeres a llevar la gestación con desdén, sin enfatizar en los cuidados que su estado amerita, contribuyendo de esta manera a una mayor morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el Ministerio de Salud; sin embargo, algunos estudios sostienen que dentro de las muertes por hemorragias e infecciones se encuentran subregistradas muchas muertes por aborto.

**En relación a la variable antecedentes de la mujer que consulta por infertilidad respecto al número de abortos provocados en mujeres del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y Hospital Carlos Monge Medrano de**

Juliaca **fue de un aborto el 65 % y 55 % respectivamente.** La infertilidad como consecuencia del aborto inducido es un dato que se llegó a conocer, mediante el estudio realizado y el impacto que tuvo en ellas un aborto provocado. Se determinó que de las 81 pacientes entrevistadas el 99% reconoció haber tenido una experiencia con uno o más abortos inducidos y encuentran una fuerte relación entre el aborto que se provocaron y el problema de esterilidad que adolecen.

## CONCLUSIONES

1. En la Región Puno los factores que más contribuyen al aborto inducido en mujeres atendidas en Hospitales de Referencia de la Región Puno en el 2010 fueron las condiciones desfavorables el cual produce un alto impacto en la Salud Pública ocasionando infertilidad y muerte en las mujeres que se practican el aborto provocado comprobándose la hipótesis planteada.
2. Los factores personales que involucran la decisión de interrumpir el embarazo fueron la edad 19 a 30 años en 48.5 % en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y 57.2% el Hospital Carlos Monge Medrano, el estado civil en ambos hospitales, la ocupación su casa 40,5 % en el hospital de Puno y 60.9 % en el Hospital de Juliaca con lo que se comprueba la hipótesis.
3. Los factores desfavorables que inducen al aborto en mujeres de la Región Puno fueron: Las razones para terminar el embarazo son económicas y deseos de estudiar, el lugar donde se realiza el aborto son clínicas privadas y casas particulares, las personas que lo realiza son los Médicos y obstetras quienes utilizan el misoprostol

por vía oral y vaginal, lo hacen por medio de la aspiración con complicaciones como la hemorragia, el costo referido en ambos hospitales es regular, en la opinión sobre la práctica del aborto se debe realizar en algunos casos como la violación con lo que se comprueba la hipótesis.

4. El impacto del aborto en la salud pública se manifiesta en las muertes maternas por aborto que, según nuestra investigación, resulta ser en un mayor porcentaje que las cifras oficiales, el número de muertes maternas ocurridas en la Región en el 2010 fueron 27 de los cuales por causa del aborto inducido fueron 04, dos en el Hospital Manuel Núñez Butrón y dos en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.
5. Las mujeres atendidas por consulta de infertilidad en Hospitales de Referencia de la Región Puno en el 2010, tienen el antecedente de uno o más abortos provocados y consideran que es por factor tubario; la mayoría atribuyen al aborto la causa de infertilidad y muestran arrepentimiento y sentimientos de culpa.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Acevedo JF. El Aborto como fenómeno social en el Perú. Lima 1993.
2. Carrera Palao C. Medicina Legal AFA EDITORES Importadores S.A. Edición 2008. Lima Perú. Páginas.299-300.
3. Chirinos Cáceres L. El aborto en el Perú: Estudio epidemiológico hospitalario en la ciudad de Iquitos, Piura y Puno”, Tesis doctoral, UPCH, 1993.
4. Ferrando Delicia, Pathfinder. El aborto clandestino en el Perú. Marzo 2002, 33pp.
5. Flora Tristán, Centro de la mujer. El aborto: un problema social. Lima, marzo 2004.
6. Galdós S, Cáceres C. El aborto: Aproximándonos a la realidad Lima Perú, 1999
7. IMAPE, Curso Nacional “Aborto y Salud Reproductiva”, Ediciones Instituto Materno Perinatal, Lima, 1997.