

PRACTICAS SEXUALES EN GESTANTES PERUANAS

SEXUAL PRACTICES IN PERUVIAN PREGNANT

Oscar Munares-García^{1,a,b}, Flor Alvarado Rodríguez^{2,a,c}

1. Licenciado en Obstetricia, Doctor en Ciencias de la Salud, Magister en Salud Pública
2. Licenciada en Obstetricia, Magister en Obstetricia
- a. Departamento Académico de Obstetricia, Facultad de Medicina San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- b. Intendencia de Investigación y Desarrollo, Superintendencia Nacional de Salud, Lima, Perú
- c. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao, Perú

RESUMEN

Objetivo. Identificar las prácticas sexuales durante el embarazo. **Métodos.** Estudio prospectivo, transversal realizado en 110 gestantes atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, Ica. Se aplicó un cuestionario validado, que evaluaba las prácticas sexuales. Posteriormente se aplicaron estadísticas descriptivas. **Resultados.** El 69,1% se encontraba entre los 20 a 34 años. 47,3% consideró que su vida sexual durante el embarazo fue regular. Al primer trimestre el 100% indicó tener juegos preliminares la mayoría de las veces, para el segundo trimestre llegó a 59,2% y para el tercero a 58,9%. La frecuencia sexual se reduce para los que tenían más veces por semana, incrementándose a los que tenían cada quince días, de 12,2% para el segundo trimestre a 39,3% para el tercer trimestre. **Conclusiones.** La práctica sexual en el embarazo presenta modificaciones conforme se incrementan los trimestres del embarazo, siendo más marcados para los juegos preliminares y frecuencia sexual.

Palabras Clave. Sexualidad, Embarazo, Práctica sexual

Financiamiento

Autofinanciado

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Recibido

27 de Diciembre del 2017

Correspondencia

Oscar Munares García. Doctor en Ciencias de la Salud
omunaresg@unmsm.edu.pe

Cita bibliográfica

Munares-García O, Alvarado F. Prácticas sexuales en gestantes peruanas. Rev Int Salud Matern Fetal. 2017; 2(4): 15 – 19.

ABSTRACT

Objective. Identify sexual practices during pregnancy. **Methods.** Prospective, cross-sectional study conducted in 110 pregnant women attended at the La Tinguiña Health Center, Ica. A validated questionnaire was applied, which evaluated sexual practices. Subsequently, descriptive statistics were applied. **Results** 69.1% were between 20 and 34 years old. 47.3% considered that their sexual life during pregnancy was regular. In the first quarter 100% indicated having preliminary games most of the time, for the second quarter it reached 59.2% and for the third quarter it reached 58.9%. The sexual frequency is reduced for those who had more times per week, increasing to those who had every fortnight, from 12.2% for the second quarter to 39.3% for the third quarter. **Conclusions** The sexual practice in pregnancy changes as the quarters increase.

Key Words: Sexuality, Pregnancy, Sexual practice

INTRODUCCIÓN

La actividad sexual se caracteriza por el deseo sexual, la práctica sexual y la orientación sexual. La práctica sexual es el conjunto de actividades que las parejas realizan para ejercer su actividad sexual. Sacomori y Cardoso definen la práctica sexual como los diversos tipos de actividades de carácter sexual desde la masturbación, sexo oral, penetración vaginal, penetración anal hasta la estimulación con vibrador, pudiendo ser variadas y de acuerdo a la experiencia ⁽¹⁾. La literatura nos indica que la práctica sexual durante el embarazo, sufre cambios, disminuyendo en su intensidad y frecuencia conforme el embarazo progresa, para luego regularizarse posterior al parto. Rodrigues y colaboradores sostienen que durante este período, la sexualidad de las embarazadas se ven afectadas por varios factores, como los cambios en la percepción de la imagen corporal, disminución del nivel de energía, presencia de síntomas fisiológicos y molestias corporales, adaptación a las nuevas funciones sociales, calidad de la relación, cambios de humor entre otros, que pueden ser experimentados por las mujeres embarazadas, así como su pareja ⁽²⁾. El objetivo de la investigación fue determinar la calidad del sexo antes y durante el embarazo en gestantes de Ica.

MATERIAL Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

Estudio prospectivo, transversal descriptivo

ÁREA DE ESTUDIO

Gestantes atendidas en el Centro de Salud La Tinguíña, ubicado en el distrito de La Tinguíña, provincia y distrito de Ica, Perú. Establecimiento perteneciente al Gobierno regional de Ica, atiende a gestantes afiliadas al Seguro Integral de Salud.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Durante el periodo de estudio se estimó una cantidad de 152 gestantes que acuden al Centro de Salud, de ellos se obtuvo una muestra de 110 gestantes, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: aceptó participar, gestante atendida en el establecimiento, exceptuando analfabetas, gestaciones múltiples y aquellas con algún problema de comprensión del cuestionario, los datos fueron recolectados el mes de agosto de 2012.

VARIABLES

Se midieron edad, nivel educativo, estado civil, edad gestacional, así como elementos de la práctica sexual como vida sexual, iniciativa para la práctica sexual, juegos preliminares, frecuencia de actividad sexual, presencia de orgasmo y una calificación final de 0 a 10 sobre su percepción de su vida sexual.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Técnicas e instrumentos. Para el estudio se aplicó la técnica del cuestionario estructurado y como instrumento se aplicó un formulario validado por Sacomori ⁽³⁾

PROCEDIMIENTOS

Inicialmente se identificaron los casos en el establecimiento de salud, se procedió a invitar a las gestantes, luego de determinar los criterios de selección se procedió a firmar el consentimiento informado, posteriormente se aplicó los cuestionarios que median la práctica sexual, con una duración media de 15 minutos.

ASPECTOS ÉTICOS

Se salvaguardaron los principios de ética en la investigación, los cuestionarios fueron aplicados de forma anónima, no se registraron nombres, se aplicó consentimiento informado y la base de datos se trabajó con códigos. El proyecto fue aprobado por el Comité de Investigación de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Alas Peruanas filial Ica.

ANÁLISIS DE DATOS

Para las variables cualitativas se empleó distribución de frecuencias y porcentajes, en la edad gestacional se dividieron en tres grupos, el primer trimestre de 1 a 14 semanas, el segundo trimestre de 15 a 28 semanas y el tercer trimestre de 29 a 41 semanas, se aplicaron tablas y figuras para mejor entendimiento.

RESULTADOS

El 69,1% se encontraba entre los 20 a 34 años, 40,9% tenía un nivel educativo secundario, 63,6% era conviviente y 50,9% se encontraba en el tercer trimestre del embarazo (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución porcentual de las gestantes, Ica

	n	%
Edad (años)		
15 a 19	25	22,7
20 a 34	76	69,1
35 a 40	9	8,2
Nivel educativo		
Primaria	5	4,5
Secundaria	45	40,9
Superior Técnica	21	19,1
Superior universitaria	39	35,5
Estado civil		
Soltera	13	11,8
Casada	27	24,5
Conviviente	70	63,6
Trimestre embarazo		
Primer	5	4,5
Segundo	49	44,5
Tercero	56	50,9
Total	110	100,0

Con respecto a la vida sexual en general, podemos indicar que un 47,3% consideró que su vida sexual durante el embarazo fue regular, y un 32,7% indicó que fue buena, al evaluarlo por trimestres, se puede apreciar que en el primer trimestre ninguna de las evaluadas indicó que su vida sexual era buena, este evento tiende ser mayor conforme se incrementa los trimestres a ser del 38,8% para el segundo trimestre a 30,4% para el tercer trimestre. Con respecto a la iniciativa para la práctica sexual, se puede apreciar que esta fue en general iniciada por ambos (59,1%). Con respecto a los juegos preliminares, se puede apreciar que en el 60,9% fue la mayoría de las veces, este evento que fue total en el primer trimestre, se reduce conforme se incrementan los trimestres llegando al 58,9% para el tercer trimestre. Con respecto a la frecuencia de la actividad sexual, se puede apreciar que para el primer trimestre es casi similar en todas, incrementándose conforme los trimestres avanzan la práctica mensual, y cada quince días, reduciéndose los de mayor frecuencia como la mayor práctica por semana. Con respecto a la presencia de orgasmo, se puede apreciar que este tiende a ser constante de acuerdo a los trimestres y depende de la posición tomada y se reduce con la penetración profunda (Tabla 2).

Finalmente con respecto a la percepción de la calidad del sexo durante el embarazo, podemos determinar la mediana de la escala se mantiene similar conforme se incrementan los trimestres de gestación, es decir los cambios no son tan marcados (Figura 1).

DISCUSIÓN

Los efectos del embarazo sobre las funciones sexuales y sensaciones sexuales no son uniformes, para unos la gestación puede ser un periodo de mayor conciencia y goce sexual, en cambio otras mujeres no notan cambios o experimentan disminución de deseos sexuales. La gestación conlleva una serie de cambios anatómicos, funcionales y emocionales que pueden alterar su relación marital. Puede experimentar disconfort o dolor durante el coito y seguir consintiendo a su pareja, lo que podría condicionar desarmonía entre ellos (4). Resulta importante indicar que más de la mitad consideran regular su vida sexual, es decir, que a pesar de las modificaciones y cambios que se producen como son el incremento del peso, los procesos cardiovasculares, psicológicos y bioquímicos, el proceso de la vida sexual se altera muy poco. Datos que difieren a lo encontrado por Valencia (5), donde el 96,6% de las gestantes que cursan el primer Trimestre, el 65,7% de las gestantes del segundo Trimestre y el 77,4% de las gestantes que cursan el tercer T tienen una actitud sexual negativa. En otro estudio realizado por Rodríguez el 47% de gestantes considera satisfactoria su vida sexual (6).


**Figura 1.** Percepción del sexo en gestantes

Tabla 2. Distribución porcentual de las características de la práctica sexual en el embarazo según trimestres de embarazo

	Primer (n=5)	Segundo (n=49)	Tercer (n=56)	Total (n=110)
	%	%	%	%
Consideración de su vida sexual				
Mala	20,0	20,4	12,5	16,4
Regular	40,0	36,7	57,1	47,3
Bueno	0,0	38,8	30,4	32,7
Excelente	40,0	4,1	0,0	3,6
Iniciativa para práctica de relaciones sexuales				
Los dos	40,0	69,4	51,8	59,1
Mi pareja	40,0	30,6	44,6	38,2
Yo misma	20,0	0,0	3,6	2,7
Juegos preliminares				
Rara vez	0,0	10,2	10,7	10,0
A veces	0,0	26,5	23,2	23,6
La mayoría de las veces	100,0	59,2	58,9	60,9
Siempre	0,0	4,1	7,1	5,5
Frecuencia relaciones sexuales				
Mensual	0,0	30,6	35,7	31,8
1 vez cada 15 días	20,0	12,2	39,3	26,4
1 vez por semana	20,0	30,6	17,9	23,6
2 veces por semana	20,0	22,4	7,1	14,5
3 veces por semana	20,0	4,1	0,0	2,7
Diario	20,0	0,0	0,0	0,9
Presencia de orgasmo				
Depende de la posición	60,0	44,9	57,1	51,8
Penetración profunda	40,0	20,4	26,8	24,5
Nunca	0,0	30,6	16,1	21,8
Al comienzo de la penetración	0,0	4,1	0,0	1,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Se tiene evidencia, que los cambios fisiológicos en el embarazo, afecta a la imagen personal de la gestante, pero este punto no se altera con la iniciativa para la actividad sexual, la cual hemos podido demostrar que se encuentra inalterada durante el embarazo. Uno de los eventos más estudiados durante el embarazo es la frecuencia de relaciones sexuales (RS), esta se reduce pero no en todas las gestantes. En el presente estudio la frecuencia de RS en el tercer trimestre, va disminuyendo de las que practican cada 15 días (39,3%) a las que practican semanalmente (17,9%), pero se incrementa en los que lo practican mensualmente (35,7%). Probablemente los cambios fisiológicos del peso y aumento del abdomen hace que las parejas que tenían RS frecuentes por semana, vean reducida la misma y prefieran espaciarlo cada quince días o mensualmente.

Datos muy diferentes encontrados por Uculmana ⁽⁷⁾ donde refiere que el 36,4% tiene RS de 1 a 3 veces por semana. En el estudio realizado por Guivovich ⁽⁸⁾ con una muestra de 1991 gestantes encontró que 1096 (70,6%) gestantes del tercer trimestre tenían RS cada 11 o más días.

Un evento que si sufre cambios significativos son los juegos previos antes de la actividad sexual, estos juegos son necesarios para el adecuado disfrute de la sexualidad, incluso durante el embarazo. Los juegos preliminares se reducen conforme se incrementan los trimestres de embarazo.

Uno de los eventos más frecuentemente estudiados durante el embarazo es la frecuencia de la actividad sexual, se puede indicar que esta se reduce, pero no

en todas las gestantes. La frecuencia de la actividad sexual se reduce en los que lo practica más de una vez por semana, pero se incrementan en los que lo practicaban cada quince días o mensual. Probablemente a los cambios fisiológicos del peso y adaptaciones fisiológicas, las parejas que tenía una actividad sexual frecuente por semana, vean reducida la misma, y prefieran espaciarlo cada quince días o mensualmente.

Se indican cambios significativos en lo referente a los juegos previos antes de la actividad sexual, estos juegos son necesarios para el adecuado disfrute de la sexualidad, incluso durante el embarazo. Los juegos preliminares se reducen conforme se incrementan los trimestres de embarazo. Así tenemos que en el primer trimestre el 100% indicó tener juegos preliminares en la mayoría de veces, en el segundo trimestre fue el 59,2% y en el tercer trimestre llegó al 58,9%, estadísticas muy similares encontradas en el estudio de Valencia (5) donde manifiesta que el 69,0% de gestantes del primer trimestre prefieren como prácticas sexuales los besos y caricias y el 30,8% la manipulación de zonas excitables, el 40,0% de las gestantes que cursan el segundo trimestre optan por los besos y caricias; al igual que las gestantes del tercer trimestre que prefieren los besos y caricias (41,9%).

La presencia del orgasmo en la gestación en nuestro estudio depende mucho de la posición (51,8%), la penetración profunda para obtención de un orgasmo llega a menos de la mitad con respecto a la anterior (24,5%). Es importante resaltar que el 21,8% de gestantes nunca tuvieron orgasmo durante la gestación, resultados similares encontró Guivovich (9) en su estudio donde el orgasmo y el placer sexual también disminuyen a medida que progresa el embarazo, incluso desde antes de la gestación (6,1%) y el (27,3%) de gestantes en el segundo trimestre refirieron no tener esta experiencia.

Es necesario incidir en la importancia de una adecuada educación sexual durante la atención preconcepcional y la atención psicoprofiláctica obstétrica una vez iniciado el embarazo, más aun sabiendo que la mayoría de gestantes se nutren de información sobre sexualidad a través de amigos y por el uso de internet y no por profesionales técnicamente capacitados. Por otra parte, una adecuada educación sexual durante la época del embarazo puede ayudar a desmitificar los miedos maternos a causar lesiones fetales y a disfrutar de un embarazo y una sexualidad más plena y placentera. Consideramos como posibles limitaciones del estudio el

tamaño de la muestra, sobre todo para el primer trimestre, por lo que indicamos que para ese grupo los datos sería referenciales. Como conclusión indicamos que la práctica sexual en el embarazo presenta modificaciones conforme se incrementan los trimestres del embarazo, siendo más marcados para los juegos preliminares y frecuencia sexual. Se concluye que la práctica sexual en el embarazo presenta modificaciones conforme se incrementan los trimestres del embarazo, siendo más marcados para los juegos preliminares y frecuencia sexual.

AGRADECIMIENTOS

A la Licenciada Isabel Aparicio Ames de la Universidad Alas Peruanas de la filial Ica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sacomori C, Luiz F. Prácticas sexuales de gestantes brasileñas. Rev Chil Obstet Ginecol 2008; 73(5):313-317. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262008000500006
2. Rodrigues A, Knepper A, Luiz F. Perfil do comportamento sexual na gestacao. Fisioter Mov 2008; 21(2):61-70. Disponible en: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/viewFile/19091/18435>
3. Sacomori C. Sexualidade na gestação: um olhar das ciências do movimento humano. (Tesis) Universidade do Estado de Santa Catarina. Brasil. 2009. Disponible en: <http://cev.org.br/biblioteca/sexualidade-gestacao-um-olhar-das-ciencias-movimento-humano>
4. Bello FA, Olayemi O, Aimakhu CO, Adekunle AO. Effect of pregnancy and childbird on sexuality of women in Ibadan, Nigeria. ISRN Obstet Gynecol 2011; 2011: 856-86. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3101881/>
5. Valencia A. Actitudes y prácticas sexuales según trimestre de embarazo en las gestantes que acuden al Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini. 2015. Disponible en: <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/4050>
6. Rodríguez M, Ramón E. Características y evolución del patrón sexual de la mujer embarazada. Revista electrónica trimestral de enfermería. N° 32, 2013. España. Disponible en: <http://revistas.um.es/eglobal/article/view/181521>
7. Uculmana ZJ. Manifestaciones de sexualidad durante el IIIT de gestación en el Hospital María Auxiliadora. Abril mayo 2008
8. Angulo T, Luján-Carpio E. Análisis de la actividad sexual de gestantes sin riesgo obstétrico que acuden a hospitales públicos de Lima Metropolitana, Perú. 2014
9. Guivovich A, Angulo T, Luján-Carpio E. Análisis de la actividad sexual de gestantes sin riesgo obstétrico que acuden a hospitales públicos de Lima Metropolitana, Perú. 2014. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v15n3/a02v15n3.pdf>