

¿ QUÉ SON?

Son infecciones causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Pueden no tener síntomas. Sólo un médico puede diagnosticarlas y proponer un tratamiento.

Si tienes VIH puedes ser más vulnerable a las infecciones (especialmente sífilis, gonorrea y clamidias), ser más difícil tratarlas y afectar a tu sistema inmunitario.

Tener una ITS aumenta el riesgo de infectarte o transmitir VIH.

Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, las chlamydias, Las verrugas genitales, el herpes genital, la hepatitis B y C y el VIH

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA?

Hay una serie de síntomas a los que hay que prestar atención porque pueden indicar que has contraído una ITS. Pero por favor recuerda que puedes tener ITS sin ningún síntoma!!



EN LA MUJER:



- Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable. Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
- Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera. Dolor en la zona de la pelvis. Escozor o picor alrededor de los genitales. Ardor al orinar o defecar.
- Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual.
- Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual con penetración. Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales, de aparición repentina.



EN EL HOMBRE:

- Secreción por la uretra. Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca. Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.
- Escozor o picor alrededor de los genitales. Dolor o inflamación en los testículos. Ardor y dolor al orinar o defecar.

¿CÓMO LAS PUEDO PREVENIR?

- Usando condones y haciéndote regularmente las pruebas de ITS aunque no tengas síntomas.
- Evitando tener relaciones sexuales mientras te tratas o te curas o haciendo sexo más seguro, además de avisar a tu compañero/a o compañeros/as sexuales que te han diagnosticado una ITS.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

•Visita : www.placerysexo.org. o www.pinkpeace.org

Envía un mail a : cybereducador@pinkpeace.org ó un Whassap : 601127349

SÍFILIS



Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Treponema pallidum*. Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene la infección, a través de sexo anal, vaginal o por el sexo oral.

Aunque ya se haya tenido una infección por sífilis en el pasado y se haya tratado correctamente, se puede volver a reinfectarse, ya que no genera protección para toda la vida.

Existen 4 etapas de la infección.

1. **Sífilis primaria:** Aparición de una úlcera (denominada chancro) no dolorosa en aquella parte del cuerpo que ha estado en contacto con la bacteria, generalmente de 2-3 semanas después de tener relaciones sexuales con una persona infectada. Suele localizarse con más frecuencia en pene, vulva, vagina o ano. Ocasionalmente pueden aparecer úlceras en la boca o labios que pueden ser dolorosas. Es posible que la úlcera pase desapercibida dependiendo de su localización. Puede tardar en curarse hasta 6 semanas y ser una importante vía de contagio para las parejas sexuales.
2. **Sífilis secundaria:** Si no se realiza tratamiento, la enfermedad progresa a esta fase debido a la proliferación de bacterias en la sangre. Suele producirse de 3-6 semanas después de la aparición de la úlcera de la sífilis primaria. Sus síntomas incluyen erupción cutánea, que a menudo afecta a las palmas de las manos y plantas de los pies, inflamación localizada en la zona genital, manchas blancas en la boca y glándulas inflamadas. Menos frecuentemente existe pérdida irregular de cabello (alopecia), sordera, problemas oculares, afectación hepática, renal o neurológica. La sífilis secundaria es altamente transmisible para las parejas sexuales durante las relaciones sexuales no protegidas. Sin tratamiento, la erupción y otros síntomas de la sífilis secundaria suelen desaparecer después de varias semanas, aunque la enfermedad no se ha curado y progresa a la fase siguiente.
3. **Sífilis latente:** Cuando los síntomas de la sífilis secundaria han desaparecido, es posible que no se produzcan síntomas durante varios años, pero la infección está presente y puede detectarse a través de una analítica de sangre.
4. **Sífilis terciaria:** Aproximadamente 1 de cada 10 personas con sífilis no tratada desarrollará graves problemas neurológicos

GNORRREA



La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria llamada *Neisseria Gonorrhoeae* (o gonococo). Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene la infección, a través de sexo anal, vaginal o por el sexo oral.

Más del 50% de las mujeres y del 10% de los hombres que tienen gonorrea no presentan síntomas. La infección en el recto y la garganta usualmente no produce ningún síntoma.

Cuando los síntomas están presentes los más comunes son: En las mujeres: Un cambio en el color u olor o cantidad del flujo vaginal, sangrado entre reglas o reglas más cuantiosas, sensación de ardor al orinar y puede haber dolor o malestar en la parte inferior del abdomen.

En los hombres: Sensación de ardor al orinar. Secreción del extremo del pene. Puede haber dolor en los testículos.