




# La prueba de detección del VIH

## PRUEBAS DEL VIH

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las personas entre los 13 y los 64 años de edad se la hagan por lo menos una vez en la vida.



### Pruebas de laboratorio.

Se toma sangre del brazo y los resultados pueden tardar unos pocos días o hasta dos semanas.

### Pruebas rápidas del VIH.

Se toma una pequeña cantidad de sangre del dedo o saliva. En este caso los resultados estarán listos en unos pocos minutos.

Es imperativo que con un **resultado positivo** de cualquiera de las pruebas anteriores se realice una prueba Western Blot confirmatoria.

### PERÍODO VENTANA

Una vez producida la infección por el VIH, los anticuerpos tardan en ser detectados. La carga viral no evoluciona de la misma manera en todas las personas. Por ello, la recomendación es realizar la prueba, al menos, entre 3 y 4 semanas después de la práctica de riesgo. Consulta a **tu médico**.

## LA PRUEBA DEL VIH ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL

Si crees que has tenido alguna práctica de riesgo, no esperes y hazte la prueba del VIH.



Cuanto antes lo sepas mejor porque podrás recibir la atención médica adecuada. En el Servicio de Información Telefónica sobre el VIH (Cruz Roja): 900 111 000, te pueden apoyar con más información.

## DÓNDE REALIZARTE LAS PRUEBAS DE MANERA GRATUITA EN ESPAÑA

- Unidades móviles
- Centros de salud
- Hospitales
- Organizaciones civiles
- Centros de diagnóstico y prevención de ITS
- Centros de planificación familiar

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en su “Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo” (2001), señala que las empresas no deberían solicitar pruebas ni reconocimientos médicos relativos al VIH y al sida a su futuro o actual personal ni deberían exigirle la presentación de diagnósticos relativos a la infección.

