



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
ESPAÑA

SEMANA 23/1991

Del 2 al 8 de junio de 1991

(Impreso el 18 de noviembre de 1991)

N.º 1899

VIGILANCIA DEL SIDA EN ESPAÑA. SITUACION A 1 DE JULIO DE 1991

Hasta el 1 de julio de 1991 se han notificado al Registro Nacional de SIDA un total de 9.112 casos. La tasa nacional acumulada asciende a 227 casos por mil habitantes.

Las tasas de las Comunidades Autónomas españolas, calculadas con el número de casos acumulados desde el comienzo de la epidemia, se presentan en la gráfica 1. Se observan diferencias marcadas

entre Comunidades. Cataluña, Madrid o el País Vasco presentan tasas varias veces mayores que otras como Castilla-La Mancha y Castilla-León.

Entre los casos se observa un predominio del grupo de riesgo de adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) (64%) seguido por el de homosexuales/bisexuales (Cuadro 1). Canarias supone una

CUADRO 1

CASOS POR EDAD, SEGUN EL GRUPO DE RIESGO. TOTAL NACIONAL

EDAD GR. RIESG.	HOMO	ADVP	HOMO + ADVP	R. HEMOD	R. TRANS	HMR	TRA HET	OTROS	DESC	TOTAL
<1	0	0	0	0	3	114	0	0	1	118
1 - 2	0	0	0	0	3	65	0	0	1	69
3 - 4	0	0	0	0	1	31	0	1	1	34
5 - 9	0	0	0	21	3	10	0	0	1	35
10 - 12	0	0	0	21	2	0	0	0	0	23
Total pediatr.	0	0	0	42	12	220	0	1	4	279
13 - 14	0	1	0	15	1	0	0	0	2	19
15 - 19	2	74	0	33	3	0	6	1	3	122
20 - 24	68	1.106	32	47	4	0	51	6	26	1.340
25 - 29	206	2.588	113	30	7	0	111	23	83	3.161
30 - 39	619	1.874	96	64	12	0	145	23	124	2.957
40 - 49	419	90	16	27	20	0	52	23	88	735
50 - 59	146	10	1	20	24	0	36	8	53	298
60 y más	36	1	1	14	30	0	13	3	23	121
Total adultos	1.496	5.744	259	250	101	0	414	87	402	8.753
Edad descono.	6	65	4	2	0	1	0	0	2	80
Total	1.502	5.809	263	294	113	221	414	88	408	9.112

HOMO = Homosexual/Bisexual; ADVP = Adictos a drogas por vía parenteral; R. HEMOD = Receptores de hemoderivados; R. TRANS = Receptores de transfusiones sanguíneas; HMR = Hijos de madre de riesgo; TRA. HET = Transmisión heterosexual; DESC = Grupo de riesgo desconocido.

SUMARIO

1. Vigilancia del SIDA en España. Situación a 1 de julio de 1991.
2. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 2.1. Situación general.
 - 2.2. Distribución geográfica.

excepción a este patrón, presentando como principal grupo de riesgo el de varones homosexuales/bisexuales al que pertenecen un 48% de los casos, frente a un 25% de ADVP.

Se han registrado 279 casos de SIDA pediátricos (menores de 13 años) que suponen el 3% del total. En ellos, sobre todo en los que aparecen en edades más tempranas, la vía de transmisión fundamental es la parenteral.

La transmisión por hemoderivados afecta de forma semejante a todos los grupos de edad tanto en niños como en adultos. La transmisión sexual

ocasiona el máximo número de casos en grupos de edad de 30 a 39 años mientras que en los adictos a drogas la máxima incidencia es en el grupo de edad de 26 a 29 años.

La gráfica 2 presenta la proporción de casos pertenecientes a cada uno de los grupos de riesgo, en cada año desde 1981. La proporción de ADVP entre los casos aumentó rápidamente en los primeros años de la epidemia, y se ha estabilizado después.

En el cuadro 2, que presenta la distribución de los distintos tipos de diagnóstico en función del

CUADRO 2
CASOS POR TIPO DE DIAGNOSTICO, SEGUN GRUPO DE RIESGO

Tipo de diagn. / Grupo riesgo	HOMO	ADVP	HOMO + ADVP	R. HEMOD	R. TRANS	HMR	TRA HET	OTROS	DESC	TOTAL
Sarcoma de Kaposi. (SK)	276	53	13	1	6	0	10	5	22	386
Infecciones oportunistas (IO)	847	3.968	175	245	85	183	304	61	293	6.161
SK + IO	166	36	11	2	0	0	5	2	12	234
Linfomas	45	111	6	12	2	1	5	4	16	202
Neumonía intersticial linfoide.	0	0	0	4	1	21	0	0	1	27
Encefalopatía por VIH	23	134	3	5	1	9	6	0	4	185
Síndrome caquético por VIH.	55	259	11	10	8	5	28	2	15	393
Tuberculosis extrapulmonar	90	1.248	44	15	10	2	56	14	45	1.524
Total	1.502	5.809	263	294	113	221	414	88	408	9.112

Los casos en los que se asocia más de un tipo de diagnóstico han sido clasificados únicamente bajo el epígrafe que aparece en primer lugar en la tabla.

HOMO = Homosexual/Bisexual; ADVP = Adictos a drogas por vía parenteral; R. HEMOD = Receptores de hemoderivados; R. TRANS = Receptores de transfusiones sanguíneas; HMR = Hijos de madre de riesgo; TRA. HET = Transmisión heterosexual; DESC = Grupo de riesgo desconocido.

CUADRO 3
CASOS Y DEFUNCIONES POR TIPO DE DIAGNOSTICO, SEGUN EL SEXO. TOTAL NACIONAL

TIPO DE DIAGNOSTICO / SEXO	CASOS			DEFUNCIONES		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Sarcoma de Kaposi (SK)	370	16	386	159	9	168
Infecciones oportunistas (IO)	5.028	1.133	6.161	2.136	479	2.615
SK + IO	222	12	234	141	5	146
Linfomas	184	18	202	111	9	120
Neumonía intersticial linfoide	15	12	27	3	3	6
Encefalopatía por VIH	149	36	185	61	16	77
Síndrome caquético por VIH	319	74	393	77	17	94
Tuberculosis extrapulmonar	1.296	228	1.524	237	50	287
Total	7.583	1.529	9.112	2.925	588	3.513

Los casos en los que se asocia más de un tipo de diagnóstico han sido clasificados únicamente bajo el epígrafe que aparece en primer lugar en la tabla.

H = hombre M = Mujeres

grupo de riesgo, se observa que entre los homosexuales/bisexuales la presentación de Sarcoma de Kaposi es más frecuente que entre los restantes grupos de riesgo, mientras que las infecciones oportunistas y tuberculosis extrapulmonar se presenta con más frecuencia entre los ADVP.


El número de casos en varones es de 7.583 frente a 1.529 en mujeres, manteniéndose la relación de 5 a 1 que venía observándose hasta ahora. Sin embargo, la letalidad registrada es similar en ambos sexos.

La sobreincidencia en varones es más acentuada en los casos que presentan Sarcoma de Kaposi y linfomas (proporción entre sexos de 23 a 1 y de 10 a 1 respectivamente) y es mínima para la neumonía intersticial linfoide (cuadro 3).

El exceso de casos en varones respecto a las mujeres prácticamente desaparece en los pediátricos, de los que hay registrados 159 varones frente a 120 mujeres.

GRAFICA 1


GRAFICA 1 - TASAS ACUMULADAS POR MILLON DE HABITANTES. COMUNIDADES AUTONOMAS.



REGISTRO NACIONAL DE SIDA
Centro Nacional de Epidemiología

GRAFICA 2

GRAFICA 2 - CASOS POR GRUPO DE RIESGO Y AÑO DE DIAGNOSTICO.



REGISTRO NACIONAL DE SIDA
Centro Nacional de Epidemiología