

OBJETIVOS:

Conocer la evolución de los nuevos diagnósticos de VIH en el País Vasco, desde 1997 hasta la actualidad, así como las variables epidemiológicas más relevantes: mecanismo de transmisión, población inmigrante y retraso diagnóstico.

MÉTODO

Las nuevas infecciones y sus principales variables son declaradas por las Unidades de Enfermedades Infecciosas de los Hospitales. Esas declaraciones son complementadas con la búsqueda activa a través de los laboratorios de microbiología de los hospitales y de las bases de historiales médicos de pacientes.

RESULTADOS


Entre los años 1.997 y 2010 se han declarado un total de 2.472 nuevos diagnósticos de VIH. Aunque en estos años se registran algunas oscilaciones tanto al alza como a la baja, podemos hablar de una tónica de estabilidad.

En 2010 se han notificado 179 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una tasa de 84,8/millón de habitantes; tasa ligeramente superior a la registrada a nivel estatal (79,3/millón de habitantes). El 75,8% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 38 años. En relación a la práctica de riesgo, la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres (41,2%) casi iguala a la transmisión a través de relaciones heterosexuales (43%). El 34,5% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas. El 43,7% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

Nuevos diagnósticos de VIH por año, 1997-2010




Nuevos diagnósticos de VIH. Vía de transmisión. Año 2010



Total casos: 2.472

Nuevos diagnósticos de VIH. Vía de transmisión. Año 2010



CONCLUSIONES

El número de nuevas infecciones por VIH se mantiene relativamente estabilizado, lo cual pone de manifiesto la necesidad de replantear las estrategias de prevención. El VIH no es una única epidemia, sino que la evolución de los diferentes grupos epidemiológicos es diferente e incluso contrapuesta. Los usuarios de drogas por vía parenteral apenas tienen presencia en los nuevos diagnósticos, mientras que los hombres que tienen sexo con hombres están registrando una prevalencia e incidencia alarmantes. La tasa de personas inmigrantes experimenta asimismo una evolución creciente en el conjunto de nuevas infecciones. Todo ello exige una máxima adecuación y adaptación de las estrategias preventivas a los diferentes colectivos epidemiológicos.