



ENCUESTA DE HABITOS SEXUALES DE PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Sanz I., Von Wichmann M.A., Camino X., Lajo N., Arrillaga A., Zulaica D.
Plan de Control y Prevención del Sida. Consulta de VIH/ITS. Hospital Donostia. San Sebastián.

OBJETIVO

Conocer y analizar los hábitos sexuales de las personas que ejercen la prostitución y que acuden a realizarse el test de VIH y a la consulta de ITS.


METODOLOGIA

A todas las personas que ejercen la prostitución que acudieron a realizarse el test de VIH y a la consulta de ITS entre octubre de 2010 y abril de 2011 de manera voluntaria, se les realizó una encuesta de hábitos sexuales.


RESULTADOS

Se han realizado 66 encuestas en un periodo de 6 meses a personas que ejercen la prostitución. El 97% fueron mujeres (edad media 33,4 años) y el 3% transexuales (edad media 42 años). El 97% refiere practicas de penetración vaginal con sus clientes; del total de personas que realizan esta practica el 98,5% usaron siempre preservativo. El 24,2% dice haber tenido practicas de penetración anal con los clientes; de estas personas el 100% usaron siempre preservativo. El 98% practica sexo oral, y de ellas el 26,1% usaron preservativo generalmente, el 24,5% siempre, el 24,5% la mitad de las veces, otro 24,5% ocasionalmente y el 1,5% nunca lo usa para esta practica. El motivo principal por el que no lo usan siempre en las relaciones de sexo oral es: los clientes no quieren 48,5%, son clientes de confianza 15,2% y los clientes pagan mas 7,6%. El 58,3% tiene pareja habitual, el 70,5% no usa nunca el preservativo en sus relaciones de penetración vaginal con sus parejas, el 75% de las personas con practicas anales tampoco lo usa con sus parejas, y el 90,9% no lo utiliza nunca en sexo oral.

PRACTICAS RIESGO MOTIVO CONSULTA



USO PRESERVATIVO RELACIONES CON CLIENTES



CONCLUSIONES

Las personas que ejercen la prostitución están concienciadas del riesgo de infección de VIH utilizando en muy altos porcentajes el preservativo en practicas de penetración. En el sexo oral los porcentajes descienden, siendo la causa principal del no uso la negativa de los clientes. Debemos seguir informando de los riesgos del sexo oral sin preservativo no tanto para el VIH sino para otras ITS, y fomentando la prueba de VIH y de otras ITS.