





Infeccions de transmissió sexual (ITS)

Sífilis (SFL)

Malaltia produïda per un bacteri que evoluciona per etapes; al principi és lleu i actualment les formes més tardanes i greus per la malaltia no són molt comuns.

Fase primària: sol estar marcada per l'aparició d'una úlcera (anomenada xancra). El xancra és ferm, rodó, petit i indolor. Apareix en el lloc per on la sífilis va entrar a l'organisme. El xancra dura de 3 a 6 setmanes i desapareix sense ser tractat. Però, si no s'administra el tractament adequat la infecció avança a la fase secundària.

Fase secundària: es caracteritza per erupcions en la pell i lesions en les membranes mucoses. L'erupció característica de la sífilis pot aparèixer tant en el palmell de les mans com en la planta dels peus, però també en altres parts del cos.

SI HAS:

- Practicat sexe anal i oral sense protecció

PROTEGEIX-TE I FES-TE EL TEST PERQUÈ

- No sempre hi ha signes aparents
- La sífilis es pot tractar i curar

La sífilis afavoreix l'adquisició del VIH per la via sexual

Seropositiu o seronegatiu, és important estar atent a la seva salut

+ Info a: www.gaispositius.org



Gaispositius

Amb el suport de:



Generalitat
de Catalunya



Ajuntament de Barcelona