

MUJERES DIAGNOSTICADAS DE INFECCIÓN POR EL VIH 2007-2013

C. Rodríguez, I. Calzas, M. Grau, M. Vera, T. Puerta, P. Clavo, J. Ballesteros, J. Del Romero
 Centro Sanitario Sandoval. IdiSSC.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

- Existen pocos datos sobre del perfil de las mujeres infectadas por el VIH en España.
- Nuestro objetivo fue analizar las características sociodemográficas, clínicas y hábitos tóxicos de las mujeres diagnosticadas de infección por el VIH y evaluar la incidencia de otras infecciones genitourinarias.









MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio descriptivo transversal observacional.
- Se incluyeron las mujeres que acudieron al CSS, entre 1/1/2007 y 31/03/2013, con objeto de realizarse la prueba del VIH y en las que se confirmó un resultado positivo (ELISA + Western Blot).

RESULTADOS

7.148 Mujeres atendidas en 1ª consulta			
C. S. Sandoval 1 enero 2007- 31 marzo 2013			
Categoría de transmisión	N	VIH+	%
HTX	4.366	63	1,4
MEP	2.614	14	0,5
MSM	149	0	0
UDI	19	2	10,5
TOTAL	7.148	79	1,1

- ### Nivel de estudios
- Primarios: 39%
 - Secundarios: 38%
 - Superiores: 10%
 - No consta: 13%
- ### Edad
- Mediana 35 años
 - Edad más frecuente 27 años



CONCLUSIONES

- El perfil de las mujeres diagnosticadas de infección por el VIH en nuestro estudio se relaciona con las siguientes características: Mujer heterosexual, inmigrante, de 27 años, que se infecta tras su llegada a España de su pareja estable, asintomática, con diagnóstico precoz del VIH y con bajo consumo de drogas/alcohol.
- Es conveniente establecer políticas preventivas específicas para las mujeres, adaptadas a sus características socio-culturales.