


INFECCIONES VAGINALES EN PORTADORAS DE DIU EN LA CONSULTA DE SS Y R DE TOLEDO

Úbeda Garcia,D.; López Muñoz,A.M.; Martínez Tercero,F.; ParaísoTorras,B.; Cuerva Murillo,C.; Cañete Palomo,M.L

1.Consulta de Salud Sexual y Reproductiva. CS de Palomarejos. Toledo

2.Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Virgen de la Salud. Toledo



Resumen

El dispositivo intrauterino o DIU es el método anticonceptivo reversible más usado en el mundo. Por otro lado, las infecciones vaginales son uno de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología.



Objetivos

Conocer la incidencia de infecciones vaginales en las usuarias de DIU, en la Consulta de Salud Sexual y Reproductiva del área de salud de Toledo. Para ello se diseñó un estudio transversal observacional en el que se revisaron 1200 historias de pacientes de enero a septiembre de 2011.

Resultados

	DIU COBRE	DIU MIRENA	TOTAL
CANDIDIASIS	64	3	67
VAGINOSIS BACTERIANA	40	2	42
TRICHOMONAS	1	0	1
SANAS	442	44	486
TOTAL	547	49	596

La candidiasis fue la infección vulvovaginal más frecuente en usuarias de DIU, produciéndose en el 11,24% de portadoras de DIU(11.7% de los de cobre y 6.12% de DIU Mirena). Se diagnosticó vaginosis bacteriana en el 7.04% de usuarias de DIU, (7.31% cobre y 4.08% hormonal). Se dio un caso de Trichomonas.



Discusión

La capacidad de Candida de adherirse a la superficie del DIU así como de formar biofilms sobre él tal y como reportan los últimos estudios constituiría un factor favorecedor de candidiasis y de recurrencias, hecho que explicaría la mayor incidencia de candidiasis en portadoras de DIU. La correlación entre vaginosis bacteriana y DIU encontrada en ensayos clínicos también se apreció en nuestro estudio.

Conclusión

El uso del DIU es un factor favorecedor para infecciones vulvovaginales.

