

Informe Día Mundial del SIDA 1 de diciembre de 2015

Documentación:

Situación del VIH-SIDA en Asturias 2014

Resumen de Indicadores de Evaluación del PAVSA 2003- 2014

Actividades del Día Mundial del SIDA en Asturias 2015

Informe realizado por:

Programa de Prevención y Atención a las Personas Afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

Servicio de Evaluación de la Salud y Programas

Dirección General de Salud Pública

Acceso a la información: www.astursalud.es

[Situación del VIH-SIDA en Asturias 2014](#)

[Resumen de Indicadores de Evaluación del PAVSA 2003-2014](#)

[Actos del Día Mundial del VIH-SIDA 2015](#)

Situación del VIH-SIDA en Asturias 2014

- En 2014 en Asturias se notificaron 72 nuevos diagnósticos de VIH, una cifra superior a la del año precedente.
- El 76% de las nuevas infecciones corresponden a hombres, siendo el grupo de edad más afectado el de 35 a 44 años.
- La principal vía de transmisión sigue siendo la vía sexual, 89% de los nuevos diagnósticos. La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres es la categoría con mayor número de infecciones, 49% de los nuevos diagnósticos, mientras que las relaciones heterosexuales (incluyendo hombres y mujeres) suponen el 40% de los mismos.
- Persiste un importante retraso diagnóstico. Aunque hay un ligero descenso con respecto al año anterior, las cifras siguen siendo llamativas: el 58% de las nuevas infecciones presentan un diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).
- Las declaraciones de casos de SIDA, personas en fases avanzadas de la enfermedad, mantienen una tendencia descendente.


A modo de resumen reseñar que la cifra de nuevos casos diagnosticados en 2014 rompe la tendencia descendente registrada en los tres años anteriores. Es importante recordar, al interpretar estos datos, el infradiagnóstico existente: se estima que un 25-30% de infectados desconocen que son portadores del virus, es decir, el número de detectados sería inferior al de casos realmente existentes. El retraso diagnóstico observado avalaría lo anteriormente expuesto.

La disminución de la percepción del riesgo, tanto por parte de la población como de los profesionales sanitarios, puede llevar a un menor número de diagnósticos y a que éstos se realicen tardíamente. El retraso diagnóstico conlleva un mayor deterioro del sistema inmunitario de la persona afectada y supone un peor pronóstico, ya que el paciente no ha podido beneficiarse del tratamiento de la infección en su inicio. Por otra parte, significa que durante este tiempo, al desconocer su estado, probablemente no ha adoptado las medidas preventivas que reduzcan la transmisión del virus a otras personas.


NOTA: Los datos de nuevas infecciones a partir del año 2003 son datos corregidos, es decir, se ha comprobado que las nuevas infecciones detectadas no estén diagnosticadas con anterioridad en otra comunidad autónoma u otro país, eliminándose los duplicados.

1. Nuevos casos de infección VIH en 2014

La tasa de infección por VIH para el año 2014 en Asturias es de 6,78 infecciones por 100.000 habitantes (72 nuevas infecciones notificadas), mientras que en España la tasa es de 7,25 infecciones por 100.000 habitantes (se notificaron 3.366 nuevos diagnósticos).



En hombres las nuevas infecciones notificadas en 2014 han sido 55 (tasa de 10,83 nuevas infecciones por 100.000), y en mujeres 17 (tasa de 3,07 nuevas infecciones por 100.000).



Un 76% de las nuevas infecciones por VIH en 2014 se han producido en hombres y un 24% en mujeres.

2. El principal segmento de población afectado en 2014 son los hombres entre 35 y 44 años

El grupo de edad de 35 a 44 años, tanto en hombres como en mujeres, es el que registra mayor número de nuevas infecciones diagnosticadas en 2014: 36,4% en hombres, y 29,4% en mujeres.

Casos declarados por grupo de edad y sexo en el momento del diagnóstico

	2014	
	MUJERES	HOMBRES
≤14 años	0	0
15-19 años	0	1
20-24 años	2	3
25-34 años	4	15
35-44 años	5	20
45-54 años	4	9
55-64 años	2	3
≥65 años	0	4
TOTAL	17	55

	2014	
	MUJERES	HOMBRES
≤14 años	0,0%	0,0%
15-19 años	0,0%	1,8%
20-24 años	11,8%	5,5%
25-34 años	23,5%	27,3%
35-44 años	29,4%	36,4%
45-54 años	23,5%	16,4%
55-64 años	11,8%	5,5%
≥65 años	0,0%	7,3%

3. Las prácticas sexuales de riesgo siguen siendo la principal vía de transmisión en las nuevas infecciones de 2014

Del total de las 72 infecciones detectadas un 89% han sido por transmisión sexual.


La transmisión en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres supone el 49% del total de las nuevas infecciones en 2014 y la transmisión heterosexual el 40% (48% en hombres y 52% en mujeres).

Un 7% de las nuevas infecciones se deben a prácticas de riesgo en el consumo de drogas por vía endovenosa.

Distribución de los casos por vía de transmisión



	2014
UDVPs	5
Relación Homo/Bisexual sin protección	35
Relación Heterosexual sin protección	29
Desconocida	3
TOTAL	72

(UDVPs: Usuario/a de drogas por vía parenteral)



Distribución de los casos por vía de transmisión y sexo

	HOMBRES	MUJERES
UDVPs	4	1
Relación Homo/Bisexual sin protección	35	-
Relación Heterosexual sin protección	14	15
Desconocida	2	1
TOTAL	55	17



Distribución de los casos por vía de transmisión y edad

	≤14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	Total
UDVPs	0	0	0	2	3	0	0	0	5
Homo/Bisexual	0	1	3	8	15	5	1	2	35
Heterosexual	0	0	2	9	6	7	3	2	29
Desconocida	0	0	0	0	1	1	1	0	3
TOTAL	0	1	5	19	25	13	5	4	72

4. El Área Sanitaria con mayor número de infecciones en 2014 ha sido Oviedo

Las nuevas infecciones siguen detectándose fundamentalmente en las áreas centrales y urbanas. De las 72 nuevas infecciones, el 47% corresponden al Área Sanitaria IV, Oviedo.

Distribución de los casos por Área Sanitaria

	2014
Área I	2
Área II	0
Área III	7
Área IV	34
Área V	21
Área VI	1
Área VII	3
Área VIII	4
TOTAL	72

5. Retraso diagnóstico


Como aproximación al diagnóstico tardío se ha utilizado la cifra de linfocitos CD4 en la primera determinación que se realiza después del diagnóstico de infección VIH. Se considera diagnóstico tardío la presencia de una cifra inferior a 350 células/ μ l y enfermedad avanzada la presencia de una cifra inferior a 200 células/ μ l.

De las 72 infecciones diagnosticadas en 2014, se conocen los niveles de CD4 en 64 de ellas (89%), y de éstas el 58% tienen un diagnóstico tardío, es decir, presentan una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/ μ l. Un 38% presentan una cifra de linfocitos CD4 inferior a 200 células/ μ l, es decir, tienen una inmunosupresión acentuada en el momento del diagnóstico con un claro riesgo de progresar hacia SIDA.

Distribución de los casos según niveles de CD4 y vía de transmisión

	≤ 199 CD4	200-350 CD4	> 350 CD4	NR*	Total
UDVPs	0	1	1	3	5
Homo/Bisexual	11	7	15	2	35
Heterosexual	11	5	11	2	29
Desconocida	2	0	0	1	3
TOTAL	24	13	27	8	72

* No se conoce el nivel de CD4




6. Situación del SIDA en Asturias

Continúa la tendencia descendente de los nuevos casos de SIDA, iniciada a mediados de los años 90 con la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad, aunque se ha ido ralentizando en los últimos años.

En 2014 en Asturias se han notificado 12 casos de SIDA, lo que supone una tasa anual de 1,1 casos por 100.000 habitantes; en España, para el mismo año, se han notificado 444 casos, lo que supone una tasa de 1,3 casos por 100.000 habitantes.

No obstante, hay que considerar estos datos como provisionales, ya que, por las características diagnósticas de esta enfermedad, existe un apreciable retraso en la notificación de los nuevos casos.




7. Mortalidad por SIDA

La mortalidad por SIDA en Asturias tiene una tendencia descendente, más claramente desde la incorporación de la terapia antirretroviral combinada.


En el año 2013, último año del que se dispone de datos definitivos, fallecieron en Asturias 20 personas (13 varones y 7 mujeres). La tasa bruta de mortalidad se situó en 1,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes (2,5 en varones y 1,3 en mujeres), siendo la tasa estandarizada 1,6 fallecidos por 100.000 habitantes (2,1 en varones y 1,1 en mujeres).

Tasa de mortalidad por SIDA por año y sexo (tasa std europea). Asturias 1996-2013




8. Gasto farmacéutico en consumo de antirretrovirales

El gasto en antirretrovirales en el año 2014 ha sido de 14.652.210 euros, habiendo recibido tratamiento un total de 2.389 pacientes (6.132,20 euros/paciente).



9. Número de pruebas de VIH realizadas

En el año 2014 se realizaron 32.944 pruebas de VIH (determinaciones de anticuerpos anti VIH 1+2 y agp24) en los laboratorios de la red sanitaria pública de Asturias.



Se realizaron 144 pruebas rápidas en las Unidades de ITS de Asturias: 86 en la Unidad de Oviedo y 58 en la de Gijón.

Tabla-resumen de la situación del VIH-SIDA Asturias 2014

Número de nuevas infecciones por VIH en 2014	72 (Tasa 6,8 casos por 100.000 habitantes)
Distribución por sexo de nuevas infecciones VIH en 2014	55 (76%) hombres 17 (24%) mujeres
Grupo de población más afectado por nuevas infecciones VIH en 2014	Hombres entre 35 y 44 años
Área Sanitaria con mayor número de nuevas infecciones VIH en 2014	Área IV (Oviedo): 34 (47%)
Nuevos casos de SIDA en 2014	12 (Tasa 1,1 casos por 100.00 habitantes)
Nuevas infecciones VIH por categoría de transmisión en 2014	89% vía sexual 7% Usuarios Drogas Vía Parenteral (UDVP) 4% desconocida
Tasa específica de mortalidad por VIH –SIDA por sexo, por 100.000 habitantes (año 2013)	Hombres 2,5 Mujeres 1,3
Años Potenciales de vida perdidos (año 2013)	Hombres 247,0 años Mujeres 170,5 años
Gasto en fármacos antirretrovirales en 2014	14.652.210 euros (2.389 pacientes)
Preservativos distribuidos gratuitamente en 2014	326.168 preservativos masculinos 4.000 preservativos femeninos
Número de pruebas de VIH realizadas en 2014	32.944 pruebas