

Relaciones sexuales entre adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto, 2017

Sexual relations between adolescents and young people from the cities of Trujillo, Chiclayo and Tarapoto, 2017

Walter Iván Abanto Vélez

Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo, Piura, Perú.

*Autor correspondiente: pswalterabanto@hotmail.com (W. Abanto).

Fecha de recepción: 17 07 2018. Fecha de aceptación: 20 08 2018

RESUMEN

La precocidad a la práctica de las relaciones sexuales que tienen muchos adolescentes ponen en riesgo su futuro, alterando su proceso de desarrollo integral, en tal sentido nace la necesidad de investigar sobre ciertas actitudes hacia la sexualidad. En tal sentido se realizó un estudio comparativo con el objetivo de conocer si existen diferencias respecto al inicio de las relaciones sexuales en adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. El universo de estudio estuvo conformado por personas de ambos sexos entre las edades de 17 años a 21 años de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto respectivamente; para lo cual se visitó diferentes instituciones educativas básicas regulares y superiores de estas ciudades; de igual manera se estimó un muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple quedando conformada por 1,464 adolescentes y jóvenes. Los resultados obtenidos mostraron que el mayor porcentaje de adolescentes y jóvenes iniciaron sus relaciones sexuales a los dieciséis años, el lugar donde se inician en la práctica sexual en su mayoría es en sus propias casas y el método anticonceptivo que usaron en su mayoría fue el condón.

Palabras clave: Relaciones sexuales; sexualidad; inicio sexual.

ABSTRACT

Due to precocity with which many adolescents have sexual intercourse, they put their future at risk, thus altering their process of comprehensive development, in this sense, the need to investigate certain attitudes in relation to sexuality arises. In this regard, a comparative study was carried out with the aim of knowing if there are differences in respect of initiation of sexual intercourse among adolescents and young people from the cities of Trujillo, Chiclayo and Tarapoto. The study universe was made up of 1,464 adolescents and young people of both sexes between the ages of 17 and 21 years old from the cities of Trujillo, Chiclayo and Tarapoto respectively, for which, we went to different regular and higher basic educational institutions of these cities. Likewise, a simple random sampling was performed. The obtained results showed that most of the adolescents and young people began having sexual intercourse at 16 years old, they had sexual intercourse for the first time in their own houses, and the contraceptive method more used was the condom.

Keywords: sexual intercourse; sexuality; sexual initiation.

INTRODUCCIÓN

Desde los primeros años de vida seguimos modelos no solamente de nuestros padres o apoderados, sino también hoy en día de

los medios de comunicación como son la televisión y el internet. Así mismo estos modelos pueden tomar más fuerza e influir en su desarrollo psicológico y con ello en

su comportamiento sexual no acorde a la edad de los pequeños; estableciéndose y tomando fuerza en la adolescencia. Sin embargo en el transcurrir de esta etapa se despierta la curiosidad por interrelacionarse con personas de su mismo sexo y también con personas del sexo opuesto ocasionando una serie de incidencias y retos, entre ello se visualiza lo relacionado a la sexualidad. Donde realizando algunas pesquisas se halló que a nivel internacional la edad promedio del inicio sexual entre diferentes naciones, pocos países latinoamericanos han sido tomados en cuenta para esta lista, entre ellos están Chile con un promedio de 17,2; Brasil con 17,4 y México que registra 18,7 años (Diario La República, 2014).

Por su parte Ramón *et al.* (2005) realizaron un estudio longitudinal descriptivo en 612 adolescentes de ambos sexos en la ciudad de la Habana, seleccionados por muestreo entre las edades de 15-19 años. Se aplicó una encuesta a cada adolescente, donde se encontraron que la gran mayoría de los jóvenes tenían relaciones sexuales precoces, siendo el condón o preservativo el método más conocido y utilizados por ellos. El número de compañeros sexuales según sexo y edad, encontrado fue entre 3 y 6 siendo más representativo para el sexo femenino que para el masculino, trayendo como consecuencia un alto nivel de promiscuidad en la adolescencia.

Por otro lado si analizamos el problema de los embarazos no deseados según datos del Informe Juventud en España 2004 (INJUVE) nos encontramos con que casi un 10% de las mujeres de entre 14 y 29 años que habían tenido relaciones sexuales completas se quedaron embarazadas sin desearlo. Este porcentaje, a tenor de los recientes datos del nuevo Informe Juventud en España 2008 (INJUVE), se ha incrementado hasta el 12%. La media de edad en que esto ocurrió fue de 19,6 años en 2004 y de 22,5 años en 2008, casi la mitad (49,5%) de los embarazos no deseados terminaron en aborto. Así mismo entre el 2002, y el 2006 se ha producido un incremento significativo general en el porcentaje de adolescentes entre 15 y 18 años que han tenido relaciones sexuales coitales, algo más alto el aumento en las chicas que en los chicos y a los 15 años que a los 17 años.

Sin embargo algunos datos a nivel nacional como lo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) quien publica que en el 2014 el embarazo adolescente en el Perú subió al 14,6 %, lo que representó un incremento del 1,6 % desde el 2000, mientras que la población total de Perú asciende a 31.151.643 habitantes.

Por su parte Rodríguez (2008) cita a Távora coordinador del Comité sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), quien plasmó en un informe que, de un millón de embarazos que se registran anualmente en el Perú, 400.000 mil terminan en abortos que generan la muerte de un 15% de mujeres.

Kolodny *et al.* (1985) refiere que alrededor de 15 millones de adolescentes se convierten en madre cada año, lo cual supone que más del 10% de todos los nacimientos ocurren en adolescentes. Esto afecta principalmente a los países en vías de desarrollo en los que se informa que el 17% de todos los partos se producen en adolescentes.

Por otro lado Abreu *et al.* (2008) realizaron un estudio observacional descriptivo transversal con el objetivo de determinar en qué medida ha disminuido la edad de inicio de las relaciones sexuales en adolescentes en un lapso aproximado de cinco años, así como algunos factores que influyeron en ello. El universo se constituyó por todos los estudiantes de 8vo grado de la ESBU Ernesto Valdés Muñoz y todos los estudiantes de 12mo grado el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez y se estimó una muestra probabilística por muestreo aleatorio simple que quedó conformada por 67 adolescentes de octavo grado y 72 de duodécimo grado. Las variables estudiadas fueron la edad, sexo, métodos anticonceptivos conocidos, método anticonceptivo empleado, edad de inicio de las relaciones sexuales, así como medio de adquirir la información acerca de sexualidad. Los resultados obtenidos mostraron una disminución de la edad de inicio de las relaciones sexuales. El mayor porcentaje de adolescentes comprendidos entre 12 y 14 años, iniciaron sus relaciones antes de los 14 años. Una de las conclusiones a la que se llegó es que la principal vía de obtener

los conocimientos acerca de sexualidad es mediante los amigos y no por el médico de la familia.

Bajo los argumentos antes señalados se puede inferir que las relaciones sexuales en los adolescentes se mantienen en el tiempo sin que poco o casi nada se pueda hacer para generar conciencia en la responsabilidad sexual; a pesar que hoy en día existan muchos canales de información. Por el contrario pareciera que los esfuerzos tanto del sistema de salud como de educación son insuficientes.

Por todo lo anteriormente señalado nace la necesidad de ahondar estudios en este fenómeno con la finalidad de conocer en qué edad y en donde se inicia las relaciones sexuales en adolescentes y que cuidados anticonceptivos utilizan entre los adolescentes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto y que diferencia pudiera existir.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación realizada es de tipo No experimental y de diseño descriptivo comparativo, aplicando una encuesta tipo Likert a adolescentes y jóvenes entre las edades de 17 a 21 años, de ambos sexos de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. Dicha encuesta fue aplicada durante los meses de mayo, junio y julio del 2017 en una muestra de 1,464 adolescentes y jóvenes por medio de un muestreo aleatorio simple.

Ética: Se tomó en cuenta mediante el conocimiento informado a las personas que responderían a la encuesta, así también como el de mantener en

confidencialidad los nombres de los participantes a esta investigación.

Recolección de la información: La información se recolectó mediante la aplicación de una encuesta a todos los adolescentes que conformaron la muestra.

Procesamiento y análisis de la información: El análisis de la información de los datos se utilizaron el programa SPSS® 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences -Versión 23) el cual, previamente verificada su funcionalidad, se usó para transformar cuantitativamente los resultados de la prueba y mediante la elaboración de tablas, se responderán a los objetivos planteados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como podemos observar en la tabla 1 la edad que tiene mayor porcentaje en el inicio sexual es a los dieciséis años con 24,18% de los evaluados en la ciudad de Trujillo; con 21,11% en la ciudad de Chiclayo respectivamente y en Tarapoto alcanza 20,29%.

En la tabla 2, las mujeres de la ciudad de Trujillo tienen mayor incidencia de inicio sexual entre las edades de diecisiete (23,36%) y dieciocho (21,72%) respectivamente, sin embargo las mujeres de la ciudad de Chiclayo tienen mayor incidencia en los dieciséis años con un 21,31% y en Tarapoto con un 25,00%.

En la tabla 3, la edad que tiene mayor porcentaje en los varones es a los dieciséis años con 30,74% de los evaluados en la ciudad de Trujillo, el 21,11% de la ciudad de Chiclayo respectivamente y en Tarapoto a los quince años alcanza 22,13%.

Tabla 1. Resultados generales de edad del inicio de las relaciones sexuales

Edad	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
once	6	1,23	2	0,41	8	1,64
doce	12	2,46	14	2,87	16	3,28
trece	13	2,66	38	7,79	49	10,04
catorce	39	7,99	75	15,37	58	11,89
quince	97	19,88	85	17,42	91	18,65
dieciséis	118	24,18	103	21,11	99	20,29
diecisiete	82	16,80	64	13,11	76	15,57
dieciocho	66	13,52	64	13,11	53	10,86
diecinueve	35	7,17	28	5,74	26	5,33
veinte	20	4,10	15	3,07	12	2,46
Total	488	100	488	100	488	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Tabla 2. Resultados generales de edad del inicio de las relaciones sexuales en mujeres

Edad	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
once	0	0	0	0	4	1,64
doce	0	0,00	5	2,05	5	2,05
trece	0	0,00	17	6,97	8	3,28
catorce	14	5,74	27	11,07	18	7,38
quince	34	13,93	37	15,16	37	15,16
dieciséis	43	17,62	52	21,31	61	25,00
diecisiete	57	23,36	37	15,16	51	20,90
dieciocho	53	21,72	39	15,98	35	14,34
diecinueve	29	11,89	22	9,02	17	6,97
veinte	14	5,74	8	3,28	8	3,28
Total	244	100	244	100	244	100

Nota: Encuesta aplicada a 1.464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Tabla 3. Resultados generales de edad del inicio de las relaciones sexuales en varones

Edad	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
once	6	2,46	2	0,41	4	1,64
doce	12	4,92	14	2,87	11	4,51
trece	13	5,33	38	7,79	41	16,80
catorce	25	10,25	75	15,37	40	16,39
quince	63	25,82	85	17,42	54	22,13
dieciséis	75	30,74	103	21,11	38	15,57
diecisiete	25	10,25	64	13,11	25	10,25
dieciocho	13	5,33	64	13,11	18	7,38
diecinueve	6	2,46	28	5,74	9	3,69
veinte	6	2,46	15	3,07	4	1,64
Total	244	100	244	100	244	100

Nota: Encuesta aplicada a 1.464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Teniendo en cuenta estas tres primeras tablas que hacen referencia a la edad promedio del inicio sexual y con mayor incidencia a nivel general el inicio sexual se da a los dieciséis años (tabla 01), a nivel de las mujeres (tabla 2) de la ciudad de Trujillo tienen mayor incidencia de inicio sexual entre las edades de diecisiete (23,36%) y dieciocho (21,72%) respectivamente, sin embargo las mujeres de la ciudad de Chiclayo tienen mayor incidencia en los dieciséis años con un 21,31% y en Tarapoto con un 25,00%. Por su parte en los varones (tabla 3) la edad que tiene mayor porcentaje es a los dieciséis años con 30,74% de los evaluados en la ciudad de Trujillo, el 21,11% de la ciudad de Chiclayo respectivamente; pero en la ciudad de Tarapoto el inicio se da a los quince años alcanzando un porcentaje de 22,13%. Estos datos se ven respaldados por Aulla (2005) quien refiere que en diversas revisiones realizadas en el departamento de pediatría y cirugía infantil. Unidad de epidemiología clínica y departamento de salud pública, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Algunos estudios muestran que la edad en que se realiza el primer coito en Chile se encuentra entre 14,4 a 16 años para los

varones entre 14,8 a 17,9 años para las mujeres. De igual modo en el estudio realizado por la obstetra Sánchez (2002), con su tesis Embarazo en adolescentes y sus complicaciones pre y post parto, nos brinda una referencia estadística de que tan jóvenes empiezan sus relaciones sexuales los adolescentes en la Provincia Cañete-Perú, se estima que en las mujeres edad promedio de su primera relación coital fue entre 12 a 15 y los varones entre 13 – 16 años.

Estos datos explican la razón porque los embarazos no deseados se dan entre estas edades ya que según el Informe Juventud en España 2004 (INJUVE) refieren que casi un 10% de las mujeres de entre 14 y 29 años que habían tenido relaciones sexuales completas se quedaron embarazadas sin desearlo y este porcentaje aumentó un 12% al 2008. Así también en el Perú el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) quien publica que en el 2014 el embarazo adolescente en el Perú subió al 14,6 %, lo que representó un incremento del 1,6 % desde el 2000. Así también Rodríguez (2008) cita a Távora quien plasmó en un informe que, de un millón de embarazos que se registran anualmente en el Perú. 400.000 mil

terminan en abortos que generan la muerte de un 15% de mujeres. Toda esta información nos aclara que existe una mayor incidencia de inicio sexual en la adolescencia y que los riesgos en las mujeres de salir embarazada, de que tengan abortos o que contraigan algún tipo de enfermedad venérea son altos.

Tabla 4. Resultados generales del lugar de inicio de las relaciones sexuales

Lugar	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
En la propia casa	294	60,25	263	53,89	317	64,96
En casa de algún amigo/a	43	8,81	77	15,78	77	15,78
En un hotel	118	24,18	120	24,59	120	24,59
Otros	33	6,76	28	5,74	28	5,74
Total	488	100	488	100	488	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Como podemos observar en la tabla 4 el lugar de inicio sexual en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto tiene un alto porcentaje en sus propias casas.

Tabla 5. Resultados generales del lugar de inicio de las relaciones sexuales en mujeres

Lugar	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
En mi casa	29	11,89	56	22,95	31	12,70
En casa de mi pareja	153	62,70	85	34,84	144	59,02
En casa de algún amigo/a	5	2,05	37	15,16	18	7,38
En un hotel	43	17,62	64	26,23	47	19,26
Otros	14	5,74	2	0,82	4	1,64
Total	244	100	244	100	244	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Como podemos observar en la tabla 5 el lugar de inicio sexual en las mujeres tiene un alto porcentaje en la casa de la pareja con un 62,70% en Trujillo, 34,83% en Chiclayo y 59,02% en Tarapoto respectivamente.

Tabla 6. Resultados generales del lugar de inicio de las relaciones sexuales en varones

Lugar	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
En mi casa	50	20,49	82	33,61	78	31,97
En casa de mi pareja	63	25,82	40	16,39	64	26,23
En casa de algún amigo/a	38	15,57	40	16,39	48	19,67
En un hotel	75	30,74	56	22,95	28	11,48
Otros	19	7,79	26	10,66	26	10,66
Total	244	100	244	100	244	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Como podemos observar en la tabla 6 el lugar de inicio sexual en los varones de la ciudad de Trujillo tiene un alto porcentaje en un hotel con el 30,74%, seguido de en la casa de la pareja con un 25,82% y en la propia casa con un 20,49%, en los varones de Chiclayo tienen un alto porcentaje en su propia casa con un 33,61% y seguido de en un hotel 22,95% y finalmente en los varones de la ciudad de Tarapoto tienen mayor porcentaje en la propia casa con un 31,97% seguido de la casa de la pareja con un 26,23% respectivamente.

Bajo estos resultados podemos ver que el inicio sexual se da en las propias casas de los evaluados en un alto porcentaje. Cabe señalar que un gran número agregó que tuvo relaciones coitales en sus hogares estando sus padres o familiares en otros ambientes de la misma casa; poniendo en manifiesto que el exceso de confianza y la experimentación de riesgo es lo que más vivencian los adolescentes y jóvenes.

Tabla 7. Resultados generales del tipo de método anticonceptivo utilizado en las relaciones sexuales

Lugar	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Condón	309	63,32	205	42,01	272	55,74
Coito interrumpido	45	9,22	162	33,20	73	14,96
Ovulo	0	0,00	8	1,64	2	0,41
pastillas	71	14,55	78	15,98	54	11,07
ninguno	63	12,91	35	7,17	87	17,83
Total	488	100	488	100	488	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Como podemos observar en la tabla 7 el tipo de método anticonceptivo más usado por adolescente evaluados en la ciudad de Trujillo es el condón con un 63,32%; en la ciudad de Chiclayo son el condón con un 42,01% y el coito interrumpido con un 33,20%; sin embargo en la ciudad de Tarapoto el condón tiene un 55,74% siendo el más usado.

Tabla 8. Resultados generales del tipo de método anticonceptivo utilizado en las relaciones sexuales en mujeres

Lugar	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Condón	134	54,92	92	37,70	124	50,82
Coito interrumpido	39	15,98	82	33,61	36	14,75
Ovulo	0	0,00	3	1,23	2	0,82
pastillas	33	13,52	64	26,23	35	14,34
ninguno	38	15,57	3	1,23	47	19,26
Total	244	100	244	100	244	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Como podemos observar en la tabla 8 el tipo de método anticonceptivo más usado por las mujeres en la ciudad de Trujillo es el condón con un 54,92%; en la ciudad de Chiclayo son el condón con un 37,70% y el coito interrumpido con un 33,61%; sin embargo en la ciudad de Tarapoto el condón tiene un 55,82% siendo el más usado.

Tabla 9. Resultados generales del tipo de método anticonceptivo utilizado en las relaciones sexuales en varones

Lugar	Trujillo		Chiclayo		Tarapoto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Condón	175	71,72	113	46,31	148	60,66
Coito interrumpido	6	2,46	80	32,79	37	15,16
Ovulo	0	0,00	5	2,05	0	0,00
pastillas	38	15,57	14	5,74	19	7,79
ninguno	25	10,25	32	13,11	40	16,39
Total	244	100	244	100	244	100

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto.

Como podemos observar en la tabla 9 el tipo de método anticonceptivo más usado por los varones en la ciudad de Trujillo es el condón con un 71,72%; en la ciudad de Chiclayo son el condón con un 46,31% y el coito interrumpido con un 32,79%; sin embargo en la ciudad de Tarapoto el condón tiene un 60,66% siendo el más usado. Estos datos son similares a los encontrados por Ramón *et al.* (2005) quienes se encontraron que la gran mayoría de los jóvenes (15-19 años) tenían relaciones sexuales precoces, siendo el condón o preservativo el método más conocido y utilizados por ellos.

CONCLUSIONES

La edad que tiene mayor incidencia promedio en el inicio sexual es a los dieciséis tanto en la ciudad de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto respectivamente. Sin embargo en un análisis por diferencia de sexo, las mujeres de la ciudad de Trujillo tienen mayor incidencia de inicio sexual entre las edades de diecisiete y dieciocho, sin embargo las mujeres de la ciudad de Chiclayo y Tarapoto a los dieciséis años. Por su parte en los varones de las ciudades de Trujillo y Chiclayo, la edad que tiene mayor porcentaje es a los dieciséis; sin embargo en los adolescentes

de la ciudad de Tarapoto el inicio las relaciones sexuales es a los quince.

Respecto al lugar donde se iniciaron sexualmente en las tres ciudades (Trujillo, Chiclayo y Tarapoto), tiene un alto porcentaje de iniciación sexual en sus propias casas. Sin embargo a nivel de diferencia de sexo en las mujeres de estas tres ciudades tienen un alto porcentaje en la casa de la pareja. Sin embargo en los varones de la ciudad de Trujillo el lugar de inicio sexual es en un hotel, seguido de en la casa de la pareja y en sus propias casas; del mismo modo en los varones de la ciudad de Chiclayo tienen un alto porcentaje en su propia casa seguido de en un hotel; a diferencia de los adolescentes de la ciudades de Tarapoto quienes tienen mayor porcentaje en la propia casa seguido de la casa de la pareja.

El tipo de método anticonceptivo más usado por adolescente evaluado en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto es el condón o preservativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, R.; Reyes, O.; García, G.; León M.; Naranjo, M. 2008. Adolescencia e inicio precoz de las relaciones sexuales. Algunos factores desencadenantes. Disponible en: [http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.\(2\)_01/p1.html](http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/p1.html)
- Aulla, J. 2005. Inicio de relaciones sexuales en ambos sexos. Monografías.com. Sustraído de la página: <https://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml>
- La República. 2014. Estudio revela la edad promedio del debut sexual en 44 países. Recuperado de la página: <http://larepublica.pe/09-11-2014/estudio-revela-en-que-paises-el-inicio-sexual-de-jovenes-es-mas-temprano>
- Kolodny, R.; Master, H.; Jonson, V. 1985. Medicina Sexual. La Habana, Ed Rev.
- Ramón, J.; Laffita, A.; Toledo, M. 2005. Primera relación sexual en adolescentes Cubanos. Revista chilena de obstetricia y ginecología. Sustraído de la página: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262005000200004&script=sci_arttext&tlng=e
- Rodríguez, B. 2008. Perú registra 400.000 abortos al año. Internacional – Legislación y género – Aborto. Disponible en: <http://www.amecopress.net/spip.php?article1290>
- Sánchez, D. 2002. Embarazo en adolescentes y sus complicaciones pre y post parto. Tesis para obtener el grado de licenciada en Obstetricia.