



Centro Sanitario Sandoval



P-203

PREVALENCIA DEL VIH EN HSH EN MADRID

Carmen Rodríguez Martín, Mar Vera García, Teresa Puerta López, Juan Ballesteros Martín, Petunia Clavo Escribano, Oskar Ayerdi Aguirrebengoa, Sonsoles del Corral Del Campo, Natividad Jerez Zamora, Marta Ruiz Fernández, Almudena Lillo Martínez, Mónica García Lotero, Montserrat Raposo Utrilla y Jorge Del Romero Guerrero Centro Sanitario Sandoval. HCSC. IdISSC. Madrid

Antecedentes y objetivo: Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son particularmente vulnerables a la infección por el VIH. El objetivo del estudio era describir la evolución temporal de la prevalencia de infección por el VIH entre 2013-2017 y las características sociodemográficas de los HSH atendidos en una clínica de ITS en Madrid.

Metodología: Se recogió la información de todos los HSH que acudieron en primera visita, a realizarse la prueba del VIH a una clínica de ITS en Madrid. A todos los pacientes se les pasó un cuestionario estructurado con objeto de identificar prácticas de riesgo para el VIH/ITS y establecer un consejo preventivo adaptado a las características socioculturales de cada individuo. Se realizó serología del VIH mediante MEIA (Architect, Abbott) y un análisis confirmatorio (Geenius. Bio-Rad).


Resultados

- Entre las personas que acudieron al Centro Sanitario Sandoval en primera consulta se efectuaron 17.897 serologías del VIH. De ellas, 7.902 correspondían a HSH.
- El 12,4% (978) de los HSH analizados resultaron positivos al VIH:
 - ✓ Correspondían a inmigrantes 455 (46,5%), la mayoría de Latinoamérica (80,7%).
 - ✓ La prevalencia del VIH entre los inmigrantes fue significativamente mayor, respecto a los españoles, 18,8% y 9,5% respectivamente ($p < 0,001$).
 - ✓ Entre los HSH un 3,7% (289) ejercían la prostitución y su prevalencia fue significativamente mayor 23,5% respecto a los HSH que no la ejercían 11,9% ($p < 0,001$).

Prevalencia a lo largo del periodo 2013-2017

| Año | Prevalencia Españoles | Prevalencia Inmigrantes | Total |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2013 | 11,7% 109/ 930 | 20,2% 75/371 | 14,1% 184/1.301 |
| 2014 | 12,7% 126/ 995 | 21,5% 67/311 | 14,8% 193/1.306 |
| 2015 | 10,1% 108/ 1.074 | 22,4% 101/451 | 13,7% 209/1.525 |
| 2016 | 9,4% 107/ 1.140 | 18,6% 111/596 | 12,6% 218/1.736 |
| 2017 | 5,4% 73/ 1.341 | 14,8% 101/693 | 8,6% 174/2.034 |
| 2013-2017 | 9,5% 523/5.480 | 18,8% 455/2.422 | 12,4% 978/ 7.902 |

Evolución de la prevalencia del VIH en HSH 2013-2017



Evolución del número de Dx del VIH en HSH 2013-2017



Conclusiones

- La prevalencia del VIH en HSH ha disminuido en los dos últimos años, especialmente en 2017, siendo más alta entre los latinoamericanos y en los trabajadores del sexo.
- Estos resultados alertan sobre la prioridad de establecer programas preventivos específicos dirigidos a este colectivo.