

Enfermedades de transmisión sexual



Antonio Rodríguez Pichardo
Coordinador del Grupo ETS-Sida. Academia Española de Dermatología. Jefe de sección. Departamento de Dermatología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Balanopostitis: inflamación del glande y la superficie interna de prepucio.

Campo oscuro: microscopio con el que se visualiza *Treponema pallidum*.

Cervicitis: inflamación de la mucosa del cuello del útero.

Chancro: úlcera primaria relacionada con las enfermedades venéreas y localizada habitualmente en la región genital.

Chancro blando: úlcera genital producida por *Haemophilus ducreyi*. También conocido como chancroide.

Chancro duro: úlcera característica de la sífilis primaria.

Clavos sífilíticos: lesiones papulosas palmoplantares características de la sífilis secundaria.

Collar de Venus: lesiones papulosas de la sífilis secundaria, cuando se localizan en la base del cuello.

Collarete de Bielt: collarete descamativo que rodea las lesiones papulosas palmoplantares (clavos sífilíticos).

Condiloma acuminado: lesión exofítica producida por la infección por papilomavirus humano.

Condilomas planos: lesiones papulosas de sífilis secundaria localizadas en zonas intertriginosas.

Corona de Venus o venérea: lesiones papulosas en la zona de implantación del cabello, características de sífilis secundaria.

Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI): infección ascendente debida a la infección cervical por agentes infecciosos de transmisión sexual.

Epididimitis: inflamación del epidídimo. Complicación de la uretritis.

Gonococia: infección producida por *Neisseria gonorrhoeae* que puede localizarse en uretra, recto, cérvix y faringe.

Inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero (FTA ABS): prueba de detección de anticuerpos frente a *T. pallidum*.

Leucorrea: exceso de secreción vaginal, habitualmente blancuzca.

Lues: aunque significa epidemia, se utiliza para referirse a la sífilis.

Parálisis general progresiva: cuadro de meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atróficos y degenerativos de la corteza cerebral, en relación con la sífilis tardía.

Pseudoparálisis de Parrot: osteocondritis de los huesos largos en la sífilis congénita.

Reagina plasmática rápida (RPR): prueba reagínica para la detección y el seguimiento evolutivo de la sífilis.

Reagínicas, pruebas: pruebas analíticas que detectan anticuerpos inespecíficos (reaginas).

Roseola: erupción maculosa y eritematosa, al comienzo del período secundario y habitualmente poco expresiva clínicamente.

Sifíldes: erupción cutánea característica del período secundario de la sífilis.

Sífilis: infección producida por *Treponema pallidum*.

Tabes dorsal: sífilis de la médula espinal, inflamación de las raíces dorsales medulares causada por *T. pallidum*.

Tinción de Gram: usada para el diagnóstico de la uretritis.

TPHA: prueba de microhemaglutinación para *T. pallidum*.

Uretritis no gonocócica (UNG): uretritis en la que no se aísla *N. gonorrhoeae*.

Uretritis: inflamación uretral caracterizada por disuria y exudación.

Vaginitis: inflamación de las paredes vaginales, habitualmente producida por candidas o tricomonas.

Vaginosis bacteriana: alteración de la mucosa vaginal que cursa con inflamación de la misma.

VDRL (*venereal disease research laboratory*): prueba reagínica de detección de anticuerpos frente a *T. pallidum*.